

IV 参 考

(文部科学省公表「平成 28 年度学校保健統計速報」から)

※肥満傾向児・痩身傾向児の算出方法

以下の式により，性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を算出し，肥満度が20%以上の者を肥満傾向児，-20%以下の者を痩身傾向児とする。

肥満度（過体重度）

$$= \left[\text{実測体重 (kg)} - \text{身長別標準体重 (kg)} \right] / \text{身長別標準体重 (kg)} \times 100 (\%)$$

$$\text{※身長別標準体重 (kg)} = a \times \text{実測身長 (cm)} - b$$

いばらき統計情報ネットワーク

学校保健統計調査,その他の調査結果は,インターネットでも公表しています。

アドレス <http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/index.html>

※ 携帯電話用のコンパクトな「いばらき携帯統計」もご利用ください。

<http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/i/index.html>



平成 28 年度 茨城県の児童・生徒の体格と疾病

学校保健統計（学校保健統計調査結果報告書）

平成 29 年 2 月 発行

編集・発行 茨城県企画部統計課

電話：029-301-2649