平成6年度 学校保健統計調査結果速報

―― 裸眼視力1.0未満 高等学校で60%を超える ――

はじめに

この調査結果速報は，文部省が毎年実施している学校保健統計調査(指定統計第15号)の平成6年度における本県の児童，生徒及び幼児の体格及び疾病・異常被患率について，文部省の速報から取りまとめたものです。

なお，今回ここに登載した数値は，いずれも概数であり，後日文部省で公表する「平成6年度学校保健統計調査報告書」をもって確定数となりますのでご了承願います。

調査の概要

1．調査の目的

この調査は，児童，生徒及び幼児の発育及び健康状態を明らかにし，学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2．調査の対象

文部大臣から調査実施校に指定された小学校，中学校，高等学校及び幼稚園に在籍する満5歳から満17歳(平成6年4月1日現在)までの児童，生徒及び幼児の一部である。(表―1)

3．調査項目

(1) 児童，生徒及び幼児の発育状態(身長，体重，胸囲及び座高)

(2) 児童，生徒及び幼児の健康状態(栄養状態，せき柱・胸郭，視力，色覚，聴力，眼の疾病・異常，耳鼻いん頭疾患，皮膚疾患，歯・口腔の疾病・異常，結核，心臓の疾病・異常・尿，寄生虫卵，その他の疾病・異常及びツベルクリン反応検査)

4．調査期間

平成6年4月から6月の間に実施された学校保健法による健康診断の結果に基づき調査した。

5．調査系統

この調査の調査系統は，次のとおりである。

文部大臣―都道府県知事―調査実施校の長

表―1　茨城県の調査対象者数及び抽出率

区分	学校数	調査対象者数及び抽出率（人，%）			
		発育状態調査	抽出率	健康状態調査	抽出率
小学校	60校	5 671	全児童数の2.5%	11 447	全児童数の5.1%
中学校	40校	4 798	全生徒数の3.9%	8 772	全生徒数の7.0%
高等学校	60校	2 696	生徒数(1～3学年)の2.2%	5 216	生徒数(1～3学年)の4.2%
幼稚園	35園	1 382	5歳在園児の5.9%	1 844	5歳在園児の7.8%
計	195校	14 547	2.9%	27 279	5.5%

6．利用上の注意

(1) 年齢は，平成６年４月１日現在の満年齢である。

(2) 数値の単位未満は，四捨五入しているため，合計の数値と内訳の計が一致しない場合がある。

調査結果の概要

1．発育状態

(1) 身長・体重・胸囲・座高の茨城県平均値

身　長

男子の身長は，５歳で111.4cm，11歳で145.1cm，14歳で165.5cm，17歳で170.9cmとなっており，５歳から７歳，９歳から14歳，16歳及び17歳の各年齢で前年度より伸びている。なお，各年齢間の身長差は，12歳と13歳の間(7.5cm)が最も大きく，16歳と17歳の間(0.5cm)が最も小さくなっている。

女子の身長は，５歳で110.3cm，11歳で146.4cm，14歳で156.4cm，17歳で158.1cmとなっており，５歳から12歳及び14歳の各年齢で前年度より伸びている。なお，各年齢間の身長差は，９歳と10歳の間(7.0cm)が最も大きく，16歳と17歳の間(0.4cm)が最も小さくなっている。(表―２)

体　重

男子の体重は，５歳で19.7kg，11歳で39.4kg，14歳で55.0kg，17歳で62.5kgとなっており，５歳，９歳，10歳，13歳及び15歳の各年齢で前年度より増えている。なお，各年齢間の体重差は，14歳と15歳の間(5.8kg)が最も大きく，16歳と17歳の間(0.7kg)が最も小さくなっている。

女子の体重は，５歳で19.4kg，11歳で39.9kg，14歳で50.7kg，17歳で52.9kgとなっており，５歳から10歳及び14歳の各年齢で前年度より増えている。なお，各年齢間の体重差は，11歳と12歳の間(5.0kg)が最も大きく，16歳と17歳の間(0.1kg)が最も小さくなっている。(表―２)

胸　囲

男子の胸囲は，５歳で57.2cm，11歳で71.8cm，14歳で81.1cm，17歳で86.7cmとなっており，５歳，９歳，10歳，15歳及び16歳の各年齢で前年度より伸びている。なお，各年齢間の胸囲差は，14歳と15歳の間(3.3cm)が最も大きく，５歳と６歳及び15歳と16歳の間(1.1cm)が最も小さくなっている。

女子の胸囲は，５歳で56.0cm，11歳で72.0cm，14歳で79.9cm，17歳で82.1cmとなっており，５歳から10歳及び13歳の各年齢で前年度より伸びている。なお，各年齢間の胸囲差は，11歳と12歳の間(4.2cm)が最も大きく，16歳と17歳の間(0.0cm)が最も小さくなっている。(表―２)

座　高

男子の座高は，５歳で62.4cm，11歳で77.8cm，14歳で87.6cm，17歳で90.5cmとなっており，７歳及び９歳から16歳までの各年齢で前年度より伸びている。なお，各年齢間の座高差は，12歳と13歳の間(3.5cm)が最も大きく，16歳と17歳の間(0.2cm)が最も小さくなっている。

女子の座高は，５歳で61.8cm，11歳で79.0cm，14歳で84.6cm，17歳で85.0cmとなっており，５歳から10歳，12歳から14歳及び17歳

の各年齢で前年度より伸びている。なお，各年齢間の座高差は，５歳と６歳及び９歳と10歳の間(3.2cm)が最も大きく，15歳と16歳の間(0.0cm)が最も小さくなっている。(表―２)

茨城県の児童，生徒及び幼児の体格は，全体的には横ばい状態となっている。なお，各年齢間体格の差は，男子では12歳と13歳及び14歳と15歳の間が大きく，女子では９歳と10歳及び11歳と12歳の間が大きくなっている。

表―２　年齢別男女別体格（平成６年度・平成５年度）

区分			身長 (cm)			体重 (kg)			胸囲 (cm)			座高 (cm)		
			6年度	5年度	差	6年度	5年度	差	6年度	5年度	差	6年度	5年度	差
男	幼稚園５歳		111.4	111.2	0.2	19.7	19.6	0.1	57.2	56.7	0.5	62.4	62.5	△0.1
	小学校	6歳	117.2	117.2	0.0	21.9	22.3	△0.4	58.3	58.8	△0.5	65.2	65.4	△0.2
		7	123.0	122.7	0.3	24.6	24.9	△0.3	60.6	61.1	△0.5	68.1	67.7	0.4
		8	128.3	128.4	△0.1	27.7	27.9	△0.2	63.4	63.5	△0.1	70.2	70.5	△0.3
		9	133.8	133.1	0.7	31.6	31.0	0.6	66.4	66.0	0.4	72.8	72.5	0.3
		10	139.0	138.5	0.5	35.0	34.8	0.2	68.9	68.9	0.0	75.2	74.8	0.4
		11	145.1	145.1	0.0	39.4	39.7	△0.3	71.8	72.2	△0.4	77.8	77.7	0.1
	中学校	12歳	152.1	152.1	0.0	44.7	45.2	△0.5	75.0	75.3	△0.3	81.0	80.8	0.2
		13	159.6	159.5	0.1	50.1	50.0	0.1	78.1	78.2	△0.1	84.5	84.5	0.0
		14	165.5	165.4	0.1	55.0	55.4	△0.4	81.1	81.5	△0.4	87.6	87.6	0.0
	高等学校	15歳	168.6	169.3	△0.7	60.8	60.4	0.4	84.4	84.3	0.1	89.6	89.5	0.1
		16	170.4	170.4	0.0	61.8	62.1	△0.3	85.5	85.5	0.0	90.3	90.1	0.2
		17	170.9	170.8	0.1	62.5	62.8	△0.3	86.7	86.9	△0.2	90.5	90.6	△0.1
女	幼稚園５歳		110.3	110.0	0.3	19.4	19.3	0.1	56.0	55.5	0.5	61.8	61.8	0.0
	小学校	6歳	116.4	115.7	0.7	21.8	21.4	0.4	57.4	57.1	0.3	65.0	64.6	0.4
		7	121.8	121.5	0.3	23.8	23.6	0.2	59.1	59.0	0.1	67.4	67.3	0.1
		8	128.1	127.4	0.7	27.8	27.3	0.5	62.5	62.2	0.3	70.3	70.2	0.1
		9	133.6	133.5	0.1	31.2	30.8	0.4	65.2	64.8	0.4	73.0	72.7	0.3
		10	140.6	140.4	0.2	35.1	34.7	0.4	68.0	67.9	0.1	76.2	75.8	0.4
		11	146.4	146.4	0.0	39.9	40.2	△0.3	72.0	72.2	△0.2	79.0	79.2	△0.2
	中学校	12歳	152.0	152.0	0.0	44.9	45.4	△0.5	76.2	76.3	△0.1	82.1	81.9	0.2
		13	155.1	155.3	△0.2	48.5	48.6	△0.1	78.6	78.6	0.0	83.9	83.8	0.1
		14	156.4	156.2	0.2	50.7	50.3	0.4	79.9	80.0	△0.1	84.6	84.3	0.3
	高等学校	15歳	157.2	157.3	△0.1	52.1	52.7	△0.6	81.3	81.4	△0.1	84.7	84.8	△0.1
		16	157.7	158.0	△0.3	53.0	54.1	△1.1	82.1	82.3	△0.2	84.7	85.0	△0.3
		17	158.1	158.2	△0.1	52.9	53.7	△0.8	82.1	82.4	△0.3	85.0	85.0	0.0

(2) 全国平均値との比較

全国平均値と比較してみると，身長と座高は男女ともほぼ全国並み，体重と胸囲については，女子がほぼ全国並みであるのに対し，男子は，体重が17歳を除き0.3～1.3kg，胸囲が0.2～0.9cmと，いずれも全国を上回っている。

このことから，本県の児童・生徒の体型は，男子が「ガッチリ型」，女子が「標準型」と言えそうである。(表—3)

表—3 年齢別男女別体格（茨城県・全国）

区分			身長（cm）			体重（kg）			胸囲（cm）			座高（cm）		
			茨城県	全国	差	茨城県	全国	差	茨城県	全国	差	茨城県	全国	差
男	幼稚園5歳		111.4	110.9	0.5	19.7	19.3	0.4	57.2	56.3	0.9	62.4	62.4	0.0
	小学校	6歳	117.2	116.8	0.4	21.9	21.6	0.3	58.3	58.0	0.3	65.2	65.2	0.0
		7	123.0	122.7	0.3	24.6	24.3	0.3	60.6	60.4	0.2	68.1	67.9	0.2
		8	128.3	128.1	0.2	27.7	27.3	0.4	63.4	62.8	0.6	70.2	70.4	△0.2
		9	133.8	133.5	0.3	31.6	30.7	0.9	66.4	65.6	0.8	72.8	72.8	0.0
		10	139.0	138.9	0.1	35.0	34.2	0.8	68.9	68.1	0.8	75.2	75.1	0.1
		11	145.1	144.9	0.2	39.4	38.4	1.0	71.8	70.9	0.9	77.8	77.6	0.2
	中学校	12歳	152.1	152.0	0.1	44.7	44.0	0.7	75.0	74.2	0.8	81.0	81.0	0.0
		13	159.6	159.3	0.3	50.1	49.3	0.8	78.1	77.4	0.7	84.5	84.5	0.0
		14	165.5	165.1	0.4	55.0	54.6	0.4	81.1	80.8	0.3	87.6	87.6	0.0
	高等学校	15歳	168.6	168.4	0.2	60.8	59.5	1.3	84.4	83.5	0.9	89.6	89.8	△0.2
		16	170.4	170.1	0.3	61.8	61.5	0.3	85.5	85.2	0.3	90.3	90.7	△0.4
		17	170.9	170.9	0.0	62.5	62.9	△0.4	86.7	86.5	0.2	90.5	91.2	△0.7
女	幼稚園5歳		110.3	110.0	0.3	19.4	18.9	0.5	56.0	55.0	1.0	61.8	62.0	△0.2
	小学校	6歳	116.4	116.1	0.3	21.8	21.2	0.6	57.4	56.8	0.6	65.0	64.8	0.2
		7	121.8	121.8	0.0	23.8	23.7	0.1	59.1	58.9	0.2	67.4	67.5	△0.1
		8	128.1	127.6	0.5	27.8	26.8	1.0	62.5	61.5	1.0	70.3	70.1	0.2
		9	133.6	133.4	0.2	31.2	30.3	0.9	65.2	64.3	0.9	73.0	72.8	0.2
		10	140.6	140.1	0.5	35.1	34.6	0.5	68.0	67.8	0.2	76.2	76.0	0.2
		11	146.4	146.7	△0.3	39.9	39.4	0.5	72.0	71.6	0.4	79.0	79.3	△0.3
	中学校	12歳	152.0	151.8	0.2	44.9	44.4	0.5	76.2	76.0	0.2	82.1	82.1	0.0
		13	155.1	155.0	0.1	48.5	47.8	0.7	78.6	78.3	0.3	83.9	83.7	0.2
		14	156.4	156.6	△0.2	50.7	50.5	0.2	79.9	80.2	△0.3	84.6	84.7	△0.1
	高等学校	15歳	157.2	157.3	△0.1	52.1	52.2	△0.1	81.3	82.0	△0.7	84.7	85.2	△0.5
		16	157.7	157.7	0.0	53.0	52.8	0.2	82.1	82.2	△0.1	84.7	85.2	△0.5
		17	158.1	158.1	0.0	52.9	53.1	△0.2	82.1	82.6	△0.5	85.0	85.3	△0.3

（注） • 差は茨城県－全国の値。 • △はマイナスを表わし，全国より小さいことを示す。

■調査から

(3) 親の世代(昭和39年度)との比較

子供たちの親の世代である30年前(昭和39年度)と14歳(中学校3年生)で比較してみると，男子は，身長が9.5cm，体重が8.8kg，胸囲が4.6cm，座高が2.9cm大きくなっており，女子は，身長が4.7cm，体重が4.8kg，胸囲が2.7cm，座高が0.9cm大きくなっている。

また，各年齢の体格を30年前と比較してみると1歳ほど成長が早まっている。(表—4，図—1)

表—4　年齢別男女別体格（平成6年度・昭和39年度）

区分		身長（cm）			体重（kg）			胸囲（cm）			座高（cm）		
		平成6年度	昭和39年度	差	平成6年度	昭和39年度	差	平成6年度	昭和39年度	差	平成6年度	昭和39年度	差
男	幼稚園5歳	111.4	108.5	2.9	19.7	18.1	1.6	57.2	55.6	1.6	62.4	61.6	0.8
	小学校 6歳	117.2	112.7	4.5	21.9	19.4	2.5	58.3	56.5	1.8	65.2	63.9	1.3
	小学校 7	123.0	117.8	5.2	24.6	22.1	2.5	60.6	58.5	2.1	68.1	66.3	1.8
	小学校 8	128.3	122.6	5.7	27.7	23.5	4.2	63.4	60.9	2.5	70.2	68.5	1.7
	小学校 9	133.8	127.6	6.2	31.6	25.9	5.7	66.4	62.4	4.0	72.8	70.5	2.3
	小学校 10	139.0	132.5	6.5	35.0	28.4	6.6	68.9	64.4	4.5	75.2	72.7	2.5
	小学校 11	145.1	137.2	7.9	39.4	31.4	8.0	71.8	66.4	5.4	77.8	74.7	3.1
	中学校 12歳	152.1	143.6	8.5	44.7	35.5	9.2	75.0	68.6	6.4	81.0	77.6	3.4
	中学校 13	159.6	150.3	9.3	50.1	40.6	9.5	78.1	72.2	5.9	84.5	80.9	3.6
	中学校 14	165.5	156.0	9.5	55.0	46.2	8.8	81.1	76.5	4.6	87.6	84.7	2.9
	高等学校 15歳	168.6	162.4	6.2	60.8	52.4	8.4	84.4	80.2	4.2	89.6	87.5	2.1
	高等学校 16	170.4	164.8	5.6	61.8	54.8	7.0	85.5	83.2	2.3	90.3	89.0	1.3
	高等学校 17	170.9	165.9	5.0	62.5	56.3	6.2	86.7	84.8	1.9	90.5	89.6	0.9
女	幼稚園5歳	110.3	107.6	2.7	19.4	17.7	1.7	56.0	54.2	1.8	61.8	61.3	0.5
	小学校 6	116.4	111.7	4.7	21.8	18.9	2.9	57.4	55.2	2.2	65.0	63.5	1.5
	小学校 7	121.8	116.8	5.0	23.8	21.2	2.6	59.1	56.9	2.2	67.4	65.8	1.6
	小学校 8	128.1	122.0	6.1	27.8	23.3	4.5	62.5	58.7	3.8	70.3	68.3	2.0
	小学校 9	133.6	127.5	6.1	31.2	25.7	5.5	65.2	61.1	4.1	73.0	70.6	2.4
	小学校 10	140.6	132.9	7.7	35.1	28.7	6.4	68.0	63.5	4.5	76.2	73.3	2.9
	小学校 11	146.4	139.1	7.3	39.9	33.5	6.4	72.0	66.6	5.4	79.0	76.4	2.6
	中学校 12歳	152.0	144.9	7.1	44.9	37.9	7.0	76.2	70.5	5.7	82.1	79.6	2.5
	中学校 13	155.1	149.4	5.7	48.5	42.4	6.1	78.6	74.2	4.4	83.9	81.8	2.1
	中学校 14	156.4	151.7	4.7	50.7	45.9	4.8	79.9	77.2	2.7	84.6	83.7	0.9
	高等学校 15歳	157.2	153.5	3.7	52.1	48.5	3.6	81.3	79.2	2.1	84.7	84.4	0.3
	高等学校 16	157.7	153.6	4.1	53.0	49.9	3.1	82.1	80.6	1.5	84.7	84.8	△0.1
	高等学校 17	158.1	153.7	4.4	52.9	51.2	1.7	82.1	81.4	0.7	85.0	85.3	△0.3

図―1　年齢別男女別体格の親の世代との比較



2．健康状態

(1) う歯(むし歯)の被患率

疾病・異常被患率の中で最も高いものはう歯(むし歯)で，幼稚園73.3%，小学校90.9%，中学校89.8%，高等学校93.8%となっており，小学校，中学校，高等学校では90%前後に達している。

この結果を前年度と比較すると，幼稚園で9.0ポイント，中学校で0.3ポイントそれぞれ

表—5　疾病・異常被患率等

〔茨城県〕

区分		裸眼視力 計	1.0 0.7未満以上	0.7 0.3未満以上	0.3未満	色覚異常	難聴	眼 トラコーマ	眼 結膜炎	眼 その他の眼疾・異常	中耳炎
幼稚園	計	15.63	10.19	4.89	0.55	…	…	—	0.08	0.69	0.24
	男	16.34	10.09	5.59	0.66	…	…	—	0.15	1.04	0.27
	女	14.89	10.28	4.17	0.44	…	…	—	—	0.33	0.21
小学校	計	22.14	8.65	8.48	5.01	2.15	1.20	0.00	0.45	0.51	0.49
	男	18.80	7.66	7.38	3.77	4.17	1.41	0.01	0.54	0.59	0.49
	女	25.62	9.67	9.63	6.31	0.06	0.98	—	0.36	0.43	0.49
中学校	計	45.65	11.84	14.20	19.61	1.96	0.45	—	0.14	0.62	0.19
	男	39.83	10.41	13.20	16.21	3.58	0.46	—	0.17	0.73	0.25
	女	51.75	13.33	15.24	23.18	0.24	0.43	—	0.10	0.50	0.13
高等学校	計	60.79	11.26	15.42	34.11	1.27	0.63	—	0.07	0.82	0.23
	男	57.71	12.07	16.89	28.75	2.46	0.69	—	0.07	1.03	0.23
	女	63.87	10.44	13.96	39.47	0.07	0.57	—	0.08	0.60	0.24

〔全　国〕(男女計)

区分		裸眼視力 計	1.0 0.7未満以上	0.7 0.3未満以上	0.3未満	色覚異常	難聴	眼 トラコーマ	眼 結膜炎	眼 その他の眼疾・異常	中耳炎
幼稚園	5歳	23.83	17.62	5.83	0.38	…	…	0.02	0.69	0.85	0.67
小学校	計	24.72	9.66	9.14	5.91	1.98	0.91	0.01	1.17	2.15	0.51
	6歳	18.40	12.72	4.67	1.01	1.97	1.13	0.01	1.40	2.70	1.23
	7	17.53	9.83	5.75	1.95	…	…	0.00	1.07	2.20	0.55
	8	20.64	8.97	7.75	3.92	…	0.84	0.00	1.14	2.01	0.55
	9	24.77	8.77	10.00	6.01	2.00	…	0.01	1.18	2.06	0.28
	10	30.15	8.91	12.05	9.19	…	0.79	0.01	1.12	1.98	0.29
	11	35.09	9.10	13.70	12.29	…	…	0.00	1.14	2.03	0.27
中学校	計	48.81	11.19	16.03	21.60	2.05	0.63	0.00	1.17	1.84	0.17
	12歳	42.55	11.33	14.34	16.89	2.05	0.70	0.00	1.34	2.23	0.28
	13	49.39	11.27	16.36	21.76	…	…	0.00	1.12	1.76	0.09
	14	54.08	10.98	17.28	25.82	…	0.56	0.01	1.06	1.55	0.13
高等学校	計	62.31	10.69	17.12	34.50	1.96	0.53	0.00	0.76	1.30	0.09
	15歳	62.04	11.14	17.52	33.38	1.96	0.59	0.00	0.86	1.48	0.11
	16	62.18	10.76	16.98	34.44	…	…	0.00	0.70	1.18	0.07
	17	62.71	10.18	16.85	35.68	…	0.48	—	0.70	1.23	0.09

低下しているが，小学校で1.0ポイント，高等学校で0.5ポイントそれぞれ上昇している。

全国と比較すると，幼稚園は3.7ポイント下回っているが，小学校は2.9ポイント，中学校は2.1ポイント，高等学校は1.8ポイントそれぞれ全国を上回っている。

また，12歳(中学校１年生)のみ調査を実施している永久歯の一人当たりの平均う歯等(喪失歯及びむし歯)数は4.5本で，前年度より0.1本増加しており，全国平均の4.0本より0.5

表—５　つづき

(単位：%)

耳・鼻・いん頭						歯・口腔					結核
						歯					
						う歯(むし歯)					
その他の耳疾患・異常	慢性副鼻腔炎	アデノイド	肥大へんとう	鼻・いん頭炎	その他の鼻・いん頭疾患・異常	計	処置完了者	未処置のある者	その他の歯の疾患	口腔疾病・異常	
0.05	—	—	5.63	0.12	—	73.27	23.09	50.18	1.14	0.25	…
0.10	—	—	6.49	0.10	—	71.33	22.42	48.91	0.79	0.33	…
—	—	—	4.72	0.13	—	75.30	23.79	51.51	1.51	0.16	…
0.60	0.24	0.03	5.36	1.55	0.61	90.86	37.48	53.38	12.67	0.24	0.09
0.65	0.21	0.07	5.38	1.91	0.92	90.88	36.41	54.47	12.84	0.19	0.17
0.54	0.27	—	5.34	1.18	0.28	90.85	38.60	52.24	12.49	0.30	—
0.36	0.11	—	2.88	0.19	1.13	89.83	42.62	47.22	10.28	0.10	—
0.40	0.18	—	3.13	0.25	1.24	88.15	41.46	46.70	11.43	0.09	—
0.31	0.04	—	2.62	0.12	1.02	91.60	43.83	47.76	9.08	0.12	—
0.29	0.24	—	0.84	1.31	1.07	93.75	48.79	44.96	2.55	0.58	0.15
0.12	0.09	—	0.79	0.98	1.17	92.19	47.17	45.01	2.60	0.47	—
0.45	0.38	—	0.89	1.64	0.97	95.31	50.40	44.91	2.50	0.69	0.31

(単位：%)

耳・鼻・いん頭						歯・口腔					結核
						歯					
						う歯(むし歯)					
その他の耳疾患・異常	慢性副鼻腔炎	アデノイド	肥大へんとう	鼻・いん頭炎	その他の鼻・いん頭疾患・異常	計	処置完了者	未処置のある者	その他の歯の疾患	口腔疾病・異常	
0.98	0.48	0.08	4.83	1.79	0.61	76.96	28.21	48.75	1.53	0.19	…
2.86	0.97	0.07	2.24	5.27	4.02	88.01	39.31	48.70	10.08	0.50	0.02
5.17	1.97	0.18	3.39	7.48	4.52	83.06	31.56	51.50	7.05	0.34	0.02
2.84	0.91	0.05	2.76	5.32	3.58	87.90	34.58	53.32	8.51	0.41	…
2.86	0.94	0.05	2.33	5.56	4.31	90.61	37.98	52.63	9.91	0.46	…
2.62	0.94	0.07	2.02	5.11	4.25	90.57	40.95	49.62	11.69	0.49	…
2.12	0.62	0.05	1.71	4.52	4.13	88.88	44.32	44.55	11.97	0.54	…
1.82	0.56	0.03	1.44	3.92	3.37	86.68	45.02	41.67	10.90	0.72	…
1.53	0.44	0.02	0.97	3.32	3.96	87.74	42.49	45.25	9.10	0.63	0.01
2.26	0.71	0.02	1.36	4.40	5.10	86.42	43.07	43.35	10.48	0.67	0.01
1.30	0.37	0.02	0.87	2.84	3.55	87.53	42.43	45.11	8.98	0.62	…
1.06	0.26	0.01	0.72	2.77	3.30	89.16	42.00	47.15	7.95	0.60	…
0.57	0.29	0.00	0.62	2.07	2.80	91.97	47.46	44.51	6.09	0.74	0.01
0.90	0.41	0.00	0.70	3.04	3.72	90.81	47.48	43.33	6.19	0.67	0.01
0.46	0.26	0.00	0.58	1.72	2.37	92.19	47.67	44.52	6.19	0.71	…
0.37	0.19	0.00	0.59	1.46	2.31	92.92	47.24	45.67	5.89	0.83	…

本多くなっている。(表―5)

(2) 裸眼視力1.0未満の被患率

う歯の次に疾病・異常被患率の高いのが，裸眼視力1.0未満の者で，幼稚園15.6%，小学校22.1%，中学校45.7%，高等学校60.8%となっており，学校段階が進むにつれて高くなっている。特に，高等学校では裸眼視力1.0未満の者が60%以上であり，また，その中でも0.3未満の者が34.1%と30%を超える状況になっている。

表―5 疾病・異常被患率等（つづき）

〔茨 城 県〕

区分		蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	栄養状態		せき柱・胸郭			伝染性皮膚疾患	心臓疾患・異常	ぜんそく
					栄養不良	肥満傾向	計	側わん症・せき柱側わん	胸郭異常・柱疾病・異常その他のせき			
幼稚園	計	0.15	…	1.31	—	1.33	0.41	—	0.41	0.16	0.25	0.96
	男	0.13	…	1.06	—	1.23	0.53	—	0.53	—	0.17	1.04
	女	0.18	…	1.56	—	1.44	0.29	—	0.29	0.33	0.34	0.89
小学校	計	0.20	0.04	1.53	0.07	2.71	0.53	0.27	0.26	0.21	0.38	1.33
	男	0.11	0.02	1.83	0.07	3.22	0.60	0.27	0.33	0.22	0.45	1.78
	女	0.30	0.05	1.22	0.07	2.17	0.47	0.27	0.20	0.21	0.31	0.87
中学校	計	0.69	0.13	…	0.15	1.45	0.70	0.36	0.33	0.01	0.98	1.25
	男	0.83	0.12	…	0.21	1.87	0.79	0.34	0.45	—	1.30	1.63
	女	0.54	0.15	…	0.08	1.00	0.60	0.39	0.21	0.02	0.64	0.85
高等学校	計	3.24	0.30	…	—	0.50	0.31	0.12	0.18	0.01	1.53	0.93
	男	3.66	0.35	…	—	0.58	0.27	—	0.27	0.03	1.45	1.01
	女	2.82	0.26	…	—	0.41	0.34	0.25	0.10	—	1.61	0.86

〔全 国〕(男女計)

区分		蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	栄養状態		せき柱・胸郭			伝染性皮膚疾患	心臓疾患・異常	ぜんそく
					栄養不良	肥満傾向	計	側わん症・せき柱側わん	胸郭異常・柱疾病・異常その他のせき			
幼稚園	5歳	0.71	…	1.85	0.10	0.82	0.45	0.22	0.23	0.29	0.38	0.84
小学校	計	0.78	0.06	2.32	0.13	2.72	0.39	0.17	0.22	0.12	0.53	1.35
	6歳	0.59	0.06	3.68	0.08	1.82	0.41	0.12	0.29	0.23	0.82	1.53
	7	0.59	0.05	3.49	0.08	2.08	0.37	0.12	0.25	0.15	0.58	1.42
	8	0.64	0.06	2.94	0.08	2.73	0.33	0.14	0.19	0.13	0.50	1.27
	9	0.67	0.05	2.01	0.11	3.14	0.38	0.16	0.22	0.06	0.51	1.36
	10	0.85	0.07	1.30	0.18	3.20	0.44	0.23	0.21	0.08	0.42	1.25
	11	1.29	0.10	0.82	0.21	3.16	0.42	0.22	0.19	0.08	0.41	1.28
中学校	計	1.91	0.14	…	0.11	1.76	0.62	0.44	0.19	0.02	0.85	1.30
	12歳	1.60	0.13	…	0.12	1.95	0.59	0.41	0.18	0.03	1.12	1.49
	13	2.01	0.12	…	0.11	1.61	0.61	0.42	0.19	0.02	0.78	1.20
	14	2.10	0.17	…	0.11	1.73	0.67	0.48	0.18	0.01	0.68	1.21
高等学校	計	1.83	0.23	…	0.10	1.34	0.39	0.27	0.12	0.01	0.98	0.77
	15歳	2.15	0.21	…	0.12	1.44	0.51	0.37	0.14	0.01	1.40	1.04
	16	1.74	0.23	…	0.12	1.35	0.38	0.26	0.13	0.01	0.85	0.69
	17	1.59	0.24	…	0.07	1.21	0.27	0.17	0.10	0.02	0.69	0.59

(注) 1．この表は，健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。

2．この表に使用している記号：「0.00」……計数が0ではないが，表示単位未満の場合。「―」……計数が0の場合。「…」……調査対象とならなかった場合。

3．茨城県分については，サンプル数が少ないので，年齢別に集計していない。

裸眼視力1.0未満の被患率を前年度と比較すると，幼稚園で9.1ポイント，高等学校で0.8ポイントそれぞれ低下しているが，小学校で0.8ポイント，中学校で0.6ポイントそれぞれ上昇している。

全国と比較すると，幼稚園で8.2ポイント，小学校で2.6ポイント，中学校で3.1ポイント，高等学校で1.5ポイントそれぞれ全国を下回っている。(表―5)

（統計課・人口労働グループ）

表―5　つづき

（単位：%）

腎臓疾患	寄生虫病	言語障害	その他の病・異常	ツベルクリン反応検査 陽性	ツベルクリン反応検査 結核の精密検査の対象者	ツベルクリン反応検査 疑陽性	ツベルクリン反応検査 陰性	永久歯の1人当たり平均う歯(むし歯)等数 計(本)	喪失歯数(本)	う歯(むし歯) 計(本)	う歯(むし歯) 処置歯数(本)	う歯(むし歯) 未処置歯数(本)
—	—	2.10	2.42	…	…	…	…	…	…	…	…	…
—	—	0.19	2.23	…	…	…	…	…	…	…	…	…
—	—	—	2.62	…	…	…	…	…	…	…	…	…
0.08	—	0.02	3.66	34.26	1.17	24.93	40.80	…	…	…	…	…
0.08	—	0.03	3.92	30.90	1.18	25.57	43.53	…	…	…	…	…
0.08	—	0.01	3.38	37.76	1.16	24.27	37.96	…	…	…	…	…
0.04	—	0.06	1.97	57.75	5.83	22.15	20.10	4.47	0.03	4.44	3.12	1.32
0.02	—	0.06	1.96	59.53	5.96	22.49	17.98	4.05	0.03	4.02	2.74	1.28
0.07	—	0.07	1.98	55.86	5.69	21.78	22.36	4.91	0.04	4.88	3.51	1.36
0.20	—	—	1.64	…	…	…	…	…	…	…	…	…
0.18	—	—	1.60	…	…	…	…	…	…	…	…	…
0.22	—	—	1.68	…	…	…	…	…	…	…	…	…

（単位：%）

腎臓疾患	寄生虫病	言語障害	その他の病・異常	ツベルクリン反応検査 陽性	ツベルクリン反応検査 結核の精密検査の対象者	ツベルクリン反応検査 疑陽性	ツベルクリン反応検査 陰性	永久歯の1人当たり平均う歯(むし歯)等数 計(本)	喪失歯数(本)	う歯(むし歯) 計(本)	う歯(むし歯) 処置歯数(本)	う歯(むし歯) 未処置歯数(本)
0.02	0.02	0.14	2.03	…	…	…	…	…	…	…	…	…
0.10	0.03	0.07	2.77	33.91	0.88	29.96	36.60	…	…	…	…	…
0.12	0.03	0.16	3.13	33.91	0.88	29.96	36.60	…	…	…	…	…
0.08	0.05	0.09	2.97	…	…	…	…	…	…	…	…	…
0.10	0.02	0.06	3.07	…	…	…	…	…	…	…	…	…
0.10	0.02	0.03	2.64	…	…	…	…	…	…	…	…	…
0.12	0.03	0.04	2.53	…	…	…	…	…	…	…	…	…
0.11	0.01	0.06	2.38	…	…	…	…	…	…	…	…	…
0.17	0.01	0.04	1.73	61.16	5.61	19.61	19.24	4.00	0.04	3.95	2.82	1.14
0.17	0.01	0.05	1.92	61.16	5.61	19.61	19.24	4.00	0.04	3.95	2.82	1.14
0.14	0.01	0.03	1.67	…	…	…	…	…	…	…	…	…
0.19	0.00	0.04	1.61	…	…	…	…	…	…	…	…	…
0.18	—	0.01	1.67	…	…	…	…	…	…	…	…	…
0.19	—	0.01	1.91	…	…	…	…	…	…	…	…	…
0.18	—	0.00	1.53	…	…	…	…	…	…	…	…	…
0.18	—	0.00	1.56	…	…	…	…	…	…	…	…	…

〔付　表〕年齢別体格の推移（茨城県）

区分			幼稚園	小学			
			5歳	6歳	7歳	8歳	9歳
身長	男	昭和39年度	108.5	112.7	117.8	122.6	127.6
		49	109.9	115.2	120.1	126.7	131.2
		59	110.7	116.6	122.5	127.6	132.6
		平成6	111.4	117.2	123.0	128.3	133.8
	女	昭和39年度	107.6	111.7	116.8	122.0	127.5
		49	109.1	114.3	119.4	125.8	130.8
		59	110.1	115.8	121.4	126.9	132.5
		平成6	110.3	116.4	121.8	128.1	133.6
体重	男	昭和39年度	18.1	19.4	22.1	23.5	25.9
		49	18.7	20.6	22.7	25.7	28.5
		59	19.3	21.7	24.2	26.6	29.7
		平成6	19.7	21.9	24.6	27.7	31.6
	女	昭和39年度	17.7	18.9	21.2	23.3	25.7
		49	18.3	20.2	22.5	25.3	28.1
		59	19.0	21.1	23.4	26.4	29.4
		平成6	19.4	21.8	23.8	27.8	31.2
胸囲	男	昭和39年度	55.6	56.5	58.5	60.9	62.4
		49	56.1	57.4	59.4	61.7	64.1
		59	56.8	58.4	60.4	62.5	64.8
		平成6	57.2	58.3	60.6	63.4	66.4
	女	昭和39年度	54.2	55.2	56.9	58.7	61.1
		49	54.8	56.0	58.0	60.5	62.9
		59	55.4	56.8	58.8	61.2	63.8
		平成6	56.0	57.4	59.1	62.5	65.2
座高	男	昭和39年度	61.6	63.9	66.3	68.5	70.5
		49	62.1	64.6	67.0	69.8	71.8
		59	62.7	65.2	67.9	70.2	72.2
		平成6	62.4	65.2	68.1	70.2	72.8
	女	昭和39年度	61.3	63.5	65.8	68.3	70.6
		49	61.6	64.1	66.5	69.5	71.6
		59	62.3	64.8	67.4	69.7	72.3
		平成6	61.8	65.0	67.4	70.3	73.0

〔付　表〕 つづき

（単位：cm，kg）

校		中学校			高等学校		
10　歳	11　歳	12　歳	13　歳	14　歳	15　歳	16　歳	17　歳
132.5	137.2	143.6	150.3	156.0	162.4	164.8	165.9
136.1	141.5	148.3	155.2	161.4	165.7	167.7	168.6
138.1	143.5	150.4	156.9	163.5	167.8	169.3	170.0
139.0	145.1	152.1	159.6	165.5	168.6	170.4	170.9
132.9	139.1	144.9	149.4	151.7	153.5	153.6	153.7
137.1	143.2	149.1	152.4	154.3	155.4	155.8	156.1
139.0	145.3	151.0	154.6	156.1	157.0	157.2	157.1
140.6	146.4	152.0	155.1	156.4	157.2	157.7	158.1
28.4	31.4	35.5	40.6	46.2	52.4	54.8	56.3
31.3	34.8	39.4	45.1	50.3	54.7	57.2	58.6
33.0	37.2	42.5	47.2	53.1	59.4	59.9	61.6
35.0	39.4	44.2	50.1	55.0	60.8	61.8	62.5
28.7	33.5	37.9	42.4	45.9	48.5	49.9	51.2
32.0	36.2	41.8	45.7	48.9	50.8	51.7	52.3
33.5	38.3	43.7	47.5	49.7	52.6	53.1	52.5
35.1	39.9	44.9	48.5	50.7	52.1	53.0	52.9
64.4	66.4	68.6	72.2	76.5	80.2	83.2	84.8
66.3	68.9	71.9	75.6	79.3	82.4	84.4	85.9
67.1	70.2	73.7	76.6	80.2	83.6	84.3	85.7
68.9	71.8	75.0	78.1	81.1	84.4	85.5	86.7
63.5	66.6	70.5	74.2	77.2	79.2	80.6	81.4
66.0	69.6	74.1	76.9	79.2	81.0	81.6	82.4
66.9	70.9	75.1	77.8	79.7	81.5	82.3	81.9
68.0	72.0	76.2	78.6	79.9	81.3	82.1	82.1
72.7	74.7	77.6	80.9	84.7	87.5	89.0	89.6
73.9	76.2	79.4	82.8	86.0	88.6	89.7	90.0
74.6	77.0	79.8	83.0	86.6	89.0	89.8	90.3
75.2	77.8	81.0	84.5	87.6	89.6	90.3	90.5
73.3	76.4	79.6	81.8	83.7	84.4	84.8	85.3
74.5	77.5	80.9	82.9	83.9	84.8	85.0	85.0
75.1	78.3	81.5	83.2	84.1	84.7	84.4	84.3
76.2	79.0	82.1	83.9	84.6	84.7	84.7	85.0