


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2017年1月26日
 水揚港 : 銚子
 漁場 : N 35°54'
 E 141°04'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	28.9	268.7	14
2	m	29.1	240.2	7
3	m	30.3	283.3	12
4	m	29.3	255.5	13
5	m	30.8	329.4	16
6	m	29.5	263.4	12
7	m	31.5	331.2	15
8	m	28.8	294.9	22
9	m	31.3	322.1	10
10	m	30.2	311.3	13
11	m	28.0	245.2	13
12	m	28.3	245.8	17
13	m	29.3	278.4	14
14	m	30.2	316.0	20
15	m	32.8	370.2	14
16	m	30.4	305.9	9
17	m	29.3	277.4	13
18	m	28.9	247.6	14
19	m	27.6	201.6	8
20	m	30.2	294.0	15
21	m	28.1	249.1	12
22	m	29.8	284.3	12
23	m	29.2	276.9	11
24	m	30.2	280.1	11
25	m	29.8	282.0	13
26	m	29.1	273.1	16
27	m	30.3	285.3	10
28	m	27.7	224.1	8
29	m	29.1	243.2	14
30	m	29.4	286.7	17

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

