


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2017年5月23日
 水揚港 : 銚子
 漁場 : N 36°22'
 E 140°54'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	35.1	456.4	5
2	m	31.8	367.3	6
3	m	30.2	281.9	4
4	m	30.0	330.1	5
5	m	29.8	280.9	6
6	m	30.3	305.3	5
7	m	34.2	405.8	4
8	m	31.4	332.6	5
9	m	31.1	357.8	8
10	m	29.6	295.2	6
11	m	28.9	252.3	6
12	m	29.6	283.1	6
13	m	32.7	375.1	5
14	m	28.5	261.6	6
15	m	26.0	179.6	4
16	m	20.2	78.4	4
17	m	24.1	134.8	5
18	m	30.0	281.3	4
19	g	31.2	390.0	6
20	m	20.7	88.2	6
21	m	18.5	54.1	3
22	m	19.7	80.5	4
23	m	20.6	85.9	4
24	m	21.7	96.7	5
25	m	20.3	77.1	4
26	m	26.7	191.5	5
27	g	29.4	283.4	5
28	m	29.8	305.9	5
29	m	29.7	300.7	5
30	m	29.8	327.6	6

測定機器：近赤外分光器（FQA-NIRGUN） 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

