

平成5年度 茨城県の児童・生徒の体格と疾病

— 学校保健統計調査結果報告書 —

はじめに

この報告書は、文部省が毎年実施している学校保健統計調査(指定統計第15号)の平成5年度における本県の児童、生徒及び幼児の体格及び疾病・異常被患率について、文部省の速報から取りまとめたものです。

なお、今回ここに登載した数値は、いずれも概数であり、後日文部省で公表する「平成5年度学校保健統計調査報告書」をもって確定数となりますので御了承願います。

調査の概要

1. 調査の目的

この調査は、児童、生徒及び幼児の発育及び健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2. 調査の対象

文部大臣から調査実施校に指定された小学校、

中学校、高等学校及び幼稚園に在籍する満5歳から満17歳(平成5年4月1日現在)までの児童、生徒及び幼児の一部である。(表-1)

3. 調査項目

- (1) 児童、生徒及び幼児の発育状態(身長、体重、胸囲及び座高)
- (2) 児童、生徒及び幼児の健康状態(栄養状態、せき柱・胸郭、視力、色覚、聴力、眼の疾病・異常、耳鼻いん頭疾患、皮膚疾患、歯・口腔の疾病・異常、結核、心臓の疾病・異常、尿、寄生虫卵、その他の疾病・異常及びツベルクリン反応検査)

4. 調査期間

平成5年4月から6月の間に実施された学校保健法による健康診断の結果に基づき調査した。

5. 調査系統

この調査の調査系統は、次のとおりである。

文部大臣—都道府県知事—調査実施校の長

表-1 茨城県の調査対象者数及び抽出率

区 分	学校数	調 査 対 象 者 数 及 び 抽 出 率 (人・%)			
		発育状態調査	抽 出 率	健康状態調査	抽 出 率
小 学 校	60校	5 716	全児童数の2.5%	11 359	全児童数の5.0%
中 学 校	40校	4 799	全生徒数の3.7%	8 709	全生徒数の6.8%
高等学校	60校	2 700	生徒数(1~3学年)の2.1%	5 056	生徒数(1~3学年)の3.9%
幼 稚 園	35園	1 439	5歳在園児の5.9%	1 879	5歳在園児の7.7%
計	195校	14 654	2.9%	27 003	5.3%

6. 利用上の注意

- (1) 年齢は、平成5年4月1日現在の満年齢である。
- (2) 数値の単位未満は、四捨五入しているため、合計の数値と内訳の計が一致しない場合がある。

調査結果の概要

1. 発育状態調査

- (1) 児童・生徒及び幼児の体格

身長

男子の身長は、5歳で111.2cm、11歳で145.1cm、14歳で165.4cm、17歳で170.8cmとなっており、5歳から8歳及び13歳から16歳までの各年齢で前年度より伸びている。なお、各年齢間の身長差は、12歳と13歳の間(7.4cm)が最も大きく、16歳と17歳の間(0.4cm)が最も小さくなっている。

女子の身長は、5歳で110.0cm、11歳で146.4cm、14歳で156.2cm、17歳で158.2cmとなっており、8歳から13歳及び15歳から17歳までの各年齢で前年度より伸びている。なお、各年齢間の身長差は、9歳と10歳の間(6.9cm)が最も大きく、16歳と17歳の間(0.2cm)が最も小さくなっている。

体重

男子の体重は、5歳で19.6kg、11歳で39.7kg、14歳で55.4kg、17歳で62.8kgとなっており、6歳、7歳、10歳から12歳及び15歳の各年齢で前年度より増えている。なお、各年齢間の体重差は、11歳と12歳の間(5.5kg)が最も大きく、16歳と17歳の間(0.7kg)が最も小さくなっている。

女子の体重は、5歳で19.3kg、11歳で40.2kg、14歳で50.3kg、17歳で53.7kgとなっており、5歳、8歳から13歳、16歳及び17歳の各年齢で前年度より増えている。なお、各年齢間の体重差は、10歳と11歳の間(5.5kg)が最も大きく、16歳と17歳の間(0.4kg)が最も小さくなっている。

胸囲

男子の胸囲は、5歳で56.7cm、11歳で72.2cm、14歳で81.5cm、17歳で86.9cmとなっており、6歳、7歳及び10歳から15歳までの各年齢で前年度より伸びている。なお、各年齢間の胸囲差は、10歳と11歳及び13歳と14歳の間(3.3cm)が最も大きく、15歳と16歳の間(1.2cm)が最も小さくなっている。

女子の胸囲は、5歳で55.5cm、11歳で72.2cm、14歳で80.0cm、17歳で82.4cmとなっており、8歳から14歳、16歳及び17歳の各年齢で前年度より伸びている。なお、各年齢間の胸囲差は、10歳と11歳の間(4.3cm)が最も大きく、16歳と17歳の間(0.1cm)が最も小さくなっている。

座高

男子の座高は、5歳で62.5cm、11歳で77.7cm、14歳で87.6cm、17歳で90.6cmとなっており、6歳から8歳、12歳、13歳及び15歳の各年齢で前年度より伸びている。なお、各年齢間の座高差は、12歳と13歳の間(3.7cm)が最も大きく、16歳と17歳の間(0.5cm)が最も小さくなっている。

女子の座高は、5歳で61.8cm、11歳で79.2cm、14歳で84.3cm、17歳で85.0cmとなっており、8歳から13歳及び15歳から17歳までの各

■ 調査から ※※※

年齢で前年度より伸びている。なお、各年齢間の座高差は、10歳と11歳の間(3.4cm)が最も大きく、16歳と17歳の間(0.0cm)が最も小さくなっている。

茨城県の児童、生徒及び幼児の体格は、全

体的には横ばい状態となっている。なお、各年齢間体格の差は、男子では12歳と13歳の間が体重及び胸囲を除いて最も大きく、女子では10歳と11歳の間が身長を除いて最も大きくなっている。(表-2)

表-2 年齢別男女別体格 (平成5年度・平成4年度)

区 分		身 長 (cm)			体 重 (kg)			胸 囲 (cm)			座 高 (cm)			
		5年度	4年度	差	5年度	4年度	差	5年度	4年度	差	5年度	4年度	差	
男	幼稚園	5歳	111.2	110.9	0.3	19.6	19.6	0.0	56.7	56.9	△0.2	62.5	62.5	0.0
	小 学 校	6歳	117.2	116.9	0.3	22.3	22.2	0.1	58.8	58.7	0.1	65.4	65.3	0.1
		7	122.7	122.2	0.5	24.9	24.2	0.7	61.1	60.5	0.6	67.7	67.5	0.2
		8	128.4	128.3	0.1	27.9	27.9	0.0	63.5	63.6	△0.1	70.5	70.3	0.2
		9	133.1	134.0	△0.9	31.0	31.2	△0.2	66.0	66.0	0.0	72.5	72.9	△0.4
		10	138.5	138.7	△0.2	34.8	34.7	0.1	68.9	68.4	0.5	74.8	74.9	△0.1
		11	145.1	145.3	△0.2	39.7	39.2	0.5	72.2	71.6	0.6	77.7	77.9	△0.2
	中 学 校	12歳	152.1	152.1	0.0	45.2	44.6	0.6	75.3	74.8	0.5	80.8	80.7	0.1
		13	159.5	159.4	0.1	50.0	50.0	0.0	78.2	78.1	0.1	84.5	84.4	0.1
		14	165.4	165.3	0.1	55.4	55.5	△0.1	81.5	81.4	0.1	87.6	87.7	△0.1
	高 等 学 校	15歳	169.3	168.2	1.1	60.4	59.2	1.2	84.3	83.6	0.7	89.5	89.1	0.4
		16	170.4	170.3	0.1	62.1	62.9	△0.8	85.5	86.3	△0.8	90.1	90.1	0.0
		17	170.8	171.2	△0.4	62.8	63.3	△0.5	86.9	87.1	△0.2	90.6	91.1	△0.5
	女	幼稚園	5歳	110.0	110.3	△0.3	19.3	19.2	0.1	55.5	55.5	0.0	61.8	62.1
小 学 校		6歳	115.7	116.1	△0.4	21.4	21.6	△0.2	57.1	57.2	△0.1	64.6	64.7	△0.1
		7	121.5	122.0	△0.5	23.6	24.1	△0.5	59.0	59.4	△0.4	67.3	67.4	△0.1
		8	127.4	127.1	0.3	27.3	26.9	0.4	62.2	61.7	0.5	70.2	69.9	0.3
		9	133.5	133.1	0.4	30.8	30.3	0.5	64.8	64.2	0.6	72.7	72.6	0.1
		10	140.4	139.5	△0.9	34.7	34.6	0.1	67.9	67.8	0.1	75.8	75.7	0.1
		11	146.4	146.0	0.4	40.2	39.3	0.9	72.2	71.6	0.6	79.2	78.8	0.4
中 学 校		12歳	152.0	151.5	0.5	45.4	44.8	0.6	76.3	75.9	0.4	81.9	81.7	0.2
		13	155.3	154.9	0.4	48.6	48.4	0.2	78.6	78.4	0.2	83.8	83.4	0.4
		14	156.2	156.5	△0.3	50.3	50.7	△0.4	80.0	79.8	0.2	84.3	84.5	△0.2
高 等 学 校		15歳	157.3	157.2	0.1	52.7	52.9	△0.2	81.4	81.5	△0.1	84.8	84.7	0.1
		16	158.0	157.5	0.5	54.1	53.4	0.7	82.3	82.0	0.3	85.0	84.7	0.3
		17	158.2	157.8	0.4	53.7	53.1	0.6	82.4	82.2	0.2	85.0	84.8	0.2

(1) 全国平均値との比較

全国平均値と比較してみると、身長と座高は男女ともほぼ全国並、体重と胸囲については、女子がほぼ全国並であるのに対し、男子は、体重が17歳を除き0.2～1.3kg、胸

囲が0.2～1.2cmと、いずれも全国を上回っている。

このことから、本県の児童・生徒の体型は、男子が「ガッチリ型」、女子が「標準型」と言えそうである。(表—3)

表—3 年齢別男女別体格(茨城県・全国)

区分	身長 (cm)			体重 (kg)			胸 囲 (cm)			座 高 (cm)				
	茨城県 平均値	全 国 平均値	差	茨城県 平均値	全 国 平均値	差	茨城県 平均値	全 国 平均値	差	茨城県 平均値	全 国 平均値	差		
男	幼稚園 5歳	111.2	110.9	0.3	19.6	19.4	0.2	56.7	56.4	0.3	62.5	62.4	0.1	
	小学校	6歳	117.2	116.8	0.4	22.3	21.7	0.6	58.8	58.2	0.6	65.4	65.2	0.2
		7	122.7	122.5	0.2	24.9	24.3	0.6	61.1	60.4	0.7	67.7	67.8	△0.1
		8	128.4	128.1	0.3	27.9	27.4	0.5	63.5	62.9	0.6	70.5	70.4	0.1
		9	133.1	133.3	△0.2	31.0	30.6	0.4	66.0	65.5	0.5	72.5	72.7	△0.2
		10	138.5	138.8	△0.3	34.8	34.3	0.5	68.9	68.2	0.7	74.8	75.1	△0.3
		11	145.1	144.7	0.4	39.7	38.4	1.3	72.2	71.0	1.2	77.7	77.6	0.1
	中学校	12歳	152.1	151.8	0.3	45.2	44.0	1.2	75.3	74.3	1.0	80.8	80.9	△0.1
		13	159.5	159.4	0.1	50.0	49.3	0.7	78.2	77.4	0.8	84.5	84.5	0.0
		14	165.4	165.0	0.4	55.4	54.7	0.7	81.5	80.9	0.6	87.6	87.6	0.0
	高等学校	15歳	169.3	168.4	0.9	60.4	59.7	0.7	84.3	83.8	0.5	89.5	89.7	△0.2
		16	170.4	170.0	0.4	62.1	61.5	0.6	85.5	85.3	0.2	90.1	90.6	△0.5
		17	170.8	170.7	0.1	62.8	62.8	0.0	86.9	86.6	0.3	90.6	91.1	△0.5
	女	幼稚園 5歳	110.0	110.0	0.0	19.3	19.0	0.3	55.5	55.2	0.3	61.8	61.9	△0.1
小学校		6歳	115.7	116.0	△0.3	21.4	21.2	0.2	57.1	56.8	0.3	64.6	64.8	△0.2
		7	121.5	121.7	△0.2	23.6	23.8	△0.2	59.0	59.0	0.0	67.3	67.4	△0.1
		8	127.4	127.4	0.0	27.3	26.8	0.5	62.2	61.5	0.7	70.2	70.1	0.1
		9	133.5	133.3	.02	30.8	30.2	0.6	64.8	64.3	0.5	72.7	72.7	0.0
		10	140.4	139.9	0.5	34.7	34.4	0.3	67.9	67.7	0.2	75.8	75.9	△0.1
		11	146.4	145.5	△0.1	40.2	39.4	0.8	72.2	71.7	0.5	79.2	79.1	0.1
中学校		12歳	152.0	151.7	0.3	45.4	44.2	1.2	76.3	75.8	0.5	81.9	82.0	△0.1
		13	155.3	155.0	0.3	48.6	47.9	0.7	78.6	78.3	0.3	83.8	83.7	0.1
		14	156.2	156.7	△0.5	50.3	50.4	△0.1	80.0	80.2	△0.2	84.3	84.6	△0.3
高等学校		15歳	157.3	157.3	0.0	52.7	52.3	0.4	81.4	81.9	△0.5	84.8	85.2	△0.4
		16	158.0	157.8	0.2	54.1	53.0	1.1	82.3	82.4	△0.1	85.0	85.3	△0.3
		17	158.2	158.0	0.2	53.7	53.2	0.5	82.4	82.7	△0.3	85.0	85.4	△0.4

(注) ・差は茨城県一全国の値。 ・△はマイナスを表わし、全国より小さいことを示す。

調査から

(3) 親の世代(昭和38年度)との比較

子供たちの親の世代である30年前(昭和38年度)と14歳(中学校3年生)で比較してみると、男子は、身長が⁹.4cm、体重が⁹.9kg、胸囲が⁵.6cm、座高が³.5cm大きくなっており、


女子は、身長が⁵.2cm、体重が⁵.1kg、胸囲が³.6cm、座高が¹.2cm大きくなっている。

また、各年齢の体格を30年前と比較してみると1歳ほど成長が早まっている。(表—4、図—1)

表—4 年齢別男女別体格 (平成5年度・昭和38年度)

区 分	身 長 (cm)			体 重 (kg)			胸 囲 (cm)			座 高 (cm)					
	平 成 5 年度	昭 和 38年度	差	平 成 5 年度	昭 和 38年度	差	平 成 5 年度	昭 和 38年度	差	平 成 5 年度	昭 和 38年度	差			
男	幼稚園 5 歳	111.2	108.5	2.7	19.6	18.1	1.5	56.7	55.6	1.1	62.5	61.9	0.6		
	小 学 校	6 歳	117.2	112.7	4.5	22.3	19.4	2.9	58.8	56.5	2.3	65.4	63.6	1.8	
		7	122.7	117.7	5.0	24.9	21.3	3.6	61.1	58.5	2.6	67.7	66.0	1.7	
		8	128.4	122.6	5.8	27.9	23.5	4.4	63.5	60.2	3.3	70.5	68.5	2.0	
		9	133.1	127.4	5.7	31.0	25.8	5.2	66.0	62.3	3.7	72.5	70.5	2.0	
		10	138.5	132.3	6.2	34.8	28.3	6.5	68.9	64.4	4.5	74.8	72.5	2.3	
	11	145.1	137.0	8.1	39.7	31.2	8.5	72.2	66.3	5.9	77.7	74.6	3.1		
	中 学 校	12 歳	152.1	142.5	9.6	45.2	34.8	10.4	75.3	68.5	6.8	80.8	77.0	3.8	
		13	159.5	149.5	10.0	50.0	40.1	9.9	78.2	71.9	6.3	84.5	80.6	3.9	
		14	165.4	156.0	9.4	55.4	45.5	9.9	81.5	75.9	5.6	87.6	84.1	3.5	
	高 等 学 校	15 歳	169.3	162.7	6.6	60.4	52.0	8.4	84.3	80.1	4.2	89.5	88.0	1.5	
		16	170.4	164.9	5.5	62.1	54.8	7.3	85.5	83.4	2.1	90.1	89.2	0.9	
		17	170.8	165.9	4.9	62.8	56.6	6.2	86.9	84.8	2.1	90.6	90.1	0.5	
	女	幼稚園 5 歳	110.0	107.3	2.7	19.3	17.5	1.8	55.5	54.1	1.4	61.8	61.0	0.8	
		小 学 校	6 歳	115.7	111.4	4.3	21.4	18.8	2.6	57.1	55.0	2.1	64.6	63.3	1.3
			7	121.5	116.6	4.9	23.6	20.6	3.0	59.0	56.6	2.4	67.3	65.6	1.7
			8	127.4	121.5	5.9	27.3	22.9	4.4	62.2	58.7	3.5	70.2	68.0	2.2
9			133.5	127.0	6.5	30.8	25.6	5.2	64.8	60.9	3.9	72.7	70.5	2.2	
10			140.4	132.5	7.9	34.7	28.7	6.0	67.9	63.6	4.3	75.8	73.1	2.7	
11		146.4	138.5	7.9	40.2	32.5	7.7	72.2	66.7	5.5	79.2	76.1	3.1		
中 学 校		12 歳	152.0	144.1	7.9	45.4	37.2	8.2	76.3	70.2	6.1	81.9	79.2	2.7	
		13	155.3	148.6	6.7	48.6	41.8	6.8	78.6	73.9	4.7	83.8	80.6	3.2	
		14	156.2	151.0	5.2	50.3	45.2	5.1	80.0	76.4	3.6	84.3	83.1	1.2	
高 等 学 校		15 歳	157.3	152.9	4.4	52.7	48.3	4.4	81.4	77.9	3.5	84.8	85.1	△0.3	
		16	158.0	153.5	4.5	54.1	49.9	4.2	82.3	80.0	2.3	85.0	85.5	△0.5	
		17	158.2	154.3	3.9	53.7	50.6	3.1	82.4	80.8	1.6	85.0	85.0	0.0	

図一 年齢別男女別体格の親の世代との比較



■ 調査から*****

2. 健康状態調査

疾病・異常被患率の中で最も高いものはう
歯(むし歯)で、幼稚園82.3%、小学校89.9%、
中学校90.1%、高等学校93.3%となっており、
幼稚園、小学校では80%以上に、中学校、高等

学校では90%以上に達している。

この結果を前年度と比較すると、小学校で
3.0ポイント、中学校で0.8ポイント、高等学校
で0.4ポイントそれぞれ低下している。幼稚園
は前年度と同じであった。

表一五 疾病・異常被患率等
〔茨城県〕

区 分	裸 眼 視 力				色 覚 異 常	難 聴	眼			中 耳 炎	
	計	1.0 0.7 未 以 満 上	0.7 0.3 未 以 満 上	0.3 未 満			ト ラ コ マ	結 膜 炎	そ の 他 の 眼 疾 ・ 異 常		
幼 稚 園	計	24.68	18.50	5.35	0.84	…	…	—	0.42	0.27	0.74
	男	24.33	19.19	4.61	0.53	…	…	—	0.31	0.43	0.44
	女	25.05	17.79	6.10	1.15	…	…	—	0.53	0.10	1.04
小 学 校	計	21.34	8.86	7.73	4.75	2.17	0.73	—	0.30	0.41	0.32
	男	18.35	8.23	6.50	3.62	4.14	0.40	—	0.31	0.50	0.35
	女	24.46	9.52	9.02	5.93	0.11	1.09	—	0.29	0.32	0.28
中 学 校	計	45.09	11.86	14.59	18.65	2.19	1.02	—	0.32	0.75	0.12
	男	40.52	11.84	13.93	14.75	4.02	1.14	—	0.41	0.78	0.10
	女	49.86	11.87	15.27	22.72	0.27	0.91	—	0.23	0.72	0.15
高 等 学 校	計	61.59	12.47	16.48	32.65	2.27	0.48	—	0.34	1.23	0.02
	男	58.67	12.87	17.02	28.77	4.15	0.61	—	0.43	0.64	0.03
	女	64.51	12.06	15.93	36.52	0.34	0.35	—	0.26	1.81	—

〔全 国〕(男女合計)

区 分	裸 眼 視 力				色 覚 異 常	難 聴	眼			中 耳 炎	
	計	1.0 0.7 未 以 満 上	0.7 0.3 未 以 満 上	0.3 未 満			ト ラ コ マ	結 膜 炎	そ の 他 の 眼 疾 ・ 異 常		
幼稚園 5 歳	20.58	15.02	5.08	0.49	…	…	0.00	0.67	0.86	0.63	
小 学 校	計 6 歳	23.78	9.43	8.81	5.54	1.95	0.88	0.00	1.24	2.04	0.51
	7 歳	19.08	12.94	5.03	1.11	2.02	1.08	—	1.45	2.40	1.12
	8 歳	17.29	9.73	5.71	1.85	…	…	—	1.21	2.01	0.64
	9 歳	20.07	8.91	7.65	3.52	…	0.94	—	1.21	1.90	0.53
	10 歳	24.03	8.51	9.69	5.84	1.90	…	—	1.19	2.08	0.33
	11 歳	28.47	8.34	11.48	8.65	…	0.64	0.00	1.15	1.91	0.32
中 学 校	計 12 歳	32.75	8.51	12.72	11.51	…	…	—	1.28	1.96	0.20
	13 歳	47.27	10.94	15.91	20.42	2.13	0.66	0.02	1.20	1.99	0.19
	13 歳	41.12	11.30	14.14	15.69	2.13	0.74	0.01	1.41	2.30	0.31
	14 歳	47.66	11.01	16.26	20.39	…	…	0.00	1.18	1.86	0.14
高 等 学 校	計 15 歳	52.54	10.53	17.20	24.81	…	0.58	0.03	1.01	1.83	0.13
	16 歳	61.89	11.24	17.18	33.47	2.00	0.53	0.01	0.82	1.22	0.15
	16 歳	61.55	11.95	17.99	31.61	2.00	0.59	—	0.97	1.49	0.18
	17 歳	61.91	11.27	17.22	33.42	…	…	0.01	0.68	1.10	0.14
17 歳	62.19	10.49	16.34	35.35	…	0.46	0.01	0.82	1.06	0.13	

この結果を全国と比較すると、幼稚園6.6ポイント、小学校1.5ポイント、中学校2.3ポイント、高等学校2.0ポイントそれぞれ上回っている。

う歯の次に疾病・異常被患率の高いのが、裸眼視力1.0未満の者で、幼稚園24.7%、小学校

21.3%、中学校45.1%、高等学校61.6%となっている。特に、高等学校では裸眼視力1.0未満の者が60%以上であり、また、その中でも0.3未満の者が32.7%と30%を超える状況になっている。(表-5)

表-5 つづき

(単位：%)

耳・鼻・いん頭						歯・口腔				結核	
その他の	耳疾・異常	慢副鼻腔炎性	アデノイド	へんとう大	鼻いん頭炎	歯			口腔の疾病・異常		
						う歯(むし歯)					
						計	処完了者	未処置者	その他		
0.07	0.30	0.12	11.02	0.30	0.19	82.27	24.03	58.24	3.16	0.62	...
0.13	0.50	0.09	11.72	0.26	0.13	83.86	24.31	59.55	2.62	0.37	...
—	0.09	0.15	10.29	0.34	0.25	80.64	23.75	56.89	3.72	0.87	...
0.80	0.52	0.10	4.01	1.88	1.31	89.90	34.60	55.30	12.22	0.61	—
0.86	0.68	0.14	3.87	2.03	1.51	90.07	33.13	56.94	12.58	0.55	—
0.74	0.36	0.06	4.16	1.72	1.09	89.72	36.14	53.58	11.85	0.68	—
0.30	0.15	—	2.57	0.50	0.69	90.11	39.01	51.10	11.55	0.52	—
0.33	0.21	—	2.78	0.56	0.79	89.13	37.14	51.99	12.00	0.68	—
0.28	0.09	—	2.36	0.44	0.59	91.14	40.96	50.18	11.09	0.35	—
0.17	0.19	—	0.74	0.84	1.27	93.30	45.85	47.45	4.95	0.04	—
0.17	0.27	—	1.17	1.22	1.66	91.98	42.26	49.72	5.37	0.08	—
0.17	0.10	—	0.31	0.47	0.87	94.62	49.43	45.18	4.54	—	—

(単位：%)

耳・鼻・いん頭						歯・口腔				結核	
その他の	耳疾・異常	慢副鼻腔炎性	アデノイド	へんとう大	鼻いん頭炎	歯			口腔の疾病・異常		
						う歯(むし歯)					
						計	処完了者	未処置者	その他		
0.88	0.30	0.03	5.08	1.83	0.88	75.66	27.96	47.70	1.87	0.29	...
2.65	0.89	0.07	2.10	5.31	4.10	88.39	38.28	50.11	9.95	0.57	0.01
4.77	1.75	0.15	3.38	7.57	4.62	83.65	30.75	52.90	6.96	0.36	0.01
2.61	1.04	0.06	2.52	5.31	3.78	88.36	33.53	54.84	8.76	0.55	...
2.61	0.83	0.12	2.41	5.57	4.08	90.49	36.41	54.08	9.86	0.52	...
2.30	0.73	0.04	1.90	5.02	4.38	91.01	40.18	50.83	11.37	0.52	...
2.19	0.64	0.03	1.40	4.88	4.36	89.30	43.57	45.73	11.64	0.72	...
1.61	0.43	0.01	1.15	3.73	3.43	87.17	44.16	43.01	10.74	0.71	...
1.46	0.45	0.01	1.02	3.95	3.86	87.78	42.19	45.58	9.30	0.58	0.03
2.16	0.72	0.01	1.34	5.10	5.08	86.38	42.48	43.91	10.85	0.66	0.03
1.26	0.39	0.01	0.97	3.40	3.24	87.64	42.50	45.14	8.93	0.53	...
1.01	0.26	0.00	0.78	3.43	3.35	89.19	41.64	47.55	8.22	0.56	...
0.70	0.27	0.01	0.69	2.28	3.27	91.25	46.56	44.69	5.95	0.66	0.02
1.13	0.35	0.00	0.80	3.13	4.42	90.17	47.11	43.06	6.10	0.64	0.02
0.54	0.27	0.03	0.62	1.92	2.73	90.99	46.00	44.99	5.91	0.63	...
0.42	0.20	0.01	0.63	1.79	2.65	92.58	46.56	46.02	5.83	0.71	...

■ 調査から*****

表一五 疾病・異常被患率等 (つづき)

(茨城県)

区 分	蛋白 検出 の者	尿糖 検出 の者	寄生 虫卵 保有者	栄 養 状 態		せ き 柱 ・ 胸 郭			伝 染 性 皮 膚 疾 患	心 臓 疾 患 ・ 異 常	ぜ ん 息	
				栄 養 不 良	肥 満 傾 向	計	せ き 柱 側 わ ん	胸 郭 の 他 の 疾 病 ・ 異 常				
幼稚園	計	—	…	0.61	—	0.73	0.64	0.25	0.38	0.27	0.39	0.98
	男	—	…	0.80	—	0.57	0.65	0.38	0.26	0.54	0.34	1.24
	女	—	…	0.40	—	0.89	0.63	0.13	0.50	—	0.44	0.71
小学校	計	0.18	0.06	1.54	0.05	1.23	0.31	0.09	0.21	0.18	0.56	1.19
	男	0.09	0.06	1.56	0.08	1.48	0.34	0.07	0.27	0.24	0.69	1.50
	女	0.28	0.06	1.52	0.02	0.97	0.27	0.12	0.15	0.11	0.43	0.87
中学校	計	0.75	0.13	…	0.15	1.86	0.65	0.40	0.25	0.11	1.34	0.97
	男	0.68	0.15	…	0.07	2.03	0.66	0.30	0.36	0.16	1.34	1.12
	女	0.82	0.10	…	0.23	1.68	0.63	0.50	0.13	0.06	1.33	0.81
高等学校	計	0.72	0.07	…	—	0.96	0.25	0.10	0.15	0.05	0.68	0.45
	男	0.99	—	…	—	0.58	0.29	0.13	0.16	0.10	0.69	0.58
	女	0.44	0.14	…	—	1.33	0.21	0.06	0.15	—	0.66	0.32

(全 国) (男女合計)

区 分	蛋白 検出 の者	尿糖 検出 の者	寄生 虫卵 保有者	栄 養 状 態		せ き 柱 ・ 胸 郭			伝 染 性 皮 膚 疾 患	心 臓 疾 患 ・ 異 常	ぜ ん 息	
				栄 養 不 良	肥 満 傾 向	計	せ き 柱 側 わ ん	胸 郭 の 他 の 疾 病 ・ 異 常				
幼稚園	5 歳	0.51	…	1.75	0.08	0.69	0.24	0.06	0.18	0.36	0.39	0.79
小 学 校	計	0.68	0.07	2.25	0.10	2.59	0.36	0.16	0.20	0.13	0.52	1.16
	6 歳	0.55	0.07	3.43	0.05	1.66	0.33	0.09	0.24	0.29	0.75	1.27
	7	0.48	0.06	3.35	0.07	1.86	0.31	0.13	0.18	0.19	0.58	1.29
	8	0.58	0.06	2.75	0.07	2.61	0.36	0.14	0.22	0.13	0.45	1.17
	9	0.63	0.07	1.92	0.12	3.01	0.37	0.18	0.19	0.07	0.49	1.11
	10	0.72	0.08	1.33	0.12	3.22	0.40	0.21	0.19	0.06	0.45	1.14
中 学 校	計	1.84	0.16	…	0.13	1.70	0.54	0.38	0.16	0.07	0.77	1.00
	12 歳	1.55	0.15	…	0.13	1.84	0.54	0.36	0.17	0.09	1.01	1.20
	13	1.90	0.16	…	0.13	1.65	0.57	0.41	0.16	0.06	0.67	0.98
高 等 学 校	計	2.05	0.17	…	0.13	1.61	0.50	0.36	0.14	0.06	0.63	0.83
	15 歳	1.68	0.25	…	0.17	1.57	0.40	0.28	0.12	0.04	0.91	0.71
	16	1.91	0.28	…	0.22	1.63	0.54	0.37	0.17	0.04	1.28	0.93
	17	1.55	0.25	…	0.17	1.58	0.38	0.28	0.10	0.03	0.77	0.69
	17	1.58	0.21	…	0.12	1.49	0.28	0.20	0.08	0.06	0.67	0.50

(注) ・「—」……計数が0の場合。
 ・「0.00」……計数が0ではないが、表示単位未満の場合。
 ・「…」……調査対象とならなかった場合。
 ・茨城県分については、サンプル数が少ないため、年齢別に集計していない。

表一五 つづき

(単位：%)

腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	言 語 障 害	そ の 病 ・ 他 異 の 常	ツベルクリン反応検査				永久歯の1人当たり平均う歯等数				
				陽 性	結 核 の 密 集 対 象 の 査 者	疑 陽 性	陰 性	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	う 歯		
										計 (本)	処 置 歯 数 (本)	未 処 置 歯 数 (本)
0.04	0.08	0.08	3.47
0.08	—	0.08	3.56
—	0.15	0.09	3.37
0.05	0.06	0.10	2.26	35.89	1.22	27.28	36.83
0.03	0.07	0.16	2.52	30.59	0.59	28.47	40.94
0.07	0.05	0.04	1.98	41.57	1.89	26.01	32.42
0.18	0.01	0.04	1.91	58.09	6.22	18.97	22.94	4.37	0.03	4.33	2.94	1.40
0.20	0.01	0.09	2.12	59.15	4.81	19.58	21.27	4.10	0.03	4.07	2.74	1.33
0.15	—	—	1.69	56.98	7.68	18.33	24.69	4.65	0.04	4.61	3.14	1.47
0.02	—	—	0.79
0.03	—	—	0.35
0.01	—	—	1.22

(単位：%)

腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	言 語 障 害	そ の 病 ・ 他 異 の 常	ツベルクリン反応検査				永久歯の1人当たり平均う歯等数				
				陽 性	結 核 の 密 集 対 象 の 査 者	疑 陽 性	陰 性	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	う 歯		
										計 (本)	処 置 歯 数 (本)	未 処 置 歯 数 (本)
0.02	0.04	0.14	2.24
0.10	0.03	0.07	2.60	33.91	1.16	29.30	36.78
0.08	0.03	0.13	2.92	33.91	1.16	29.30	36.78
0.12	0.03	0.11	2.79
0.09	0.07	0.06	2.80
0.11	0.04	0.05	2.56
0.10	0.03	0.05	2.45
0.09	0.01	0.04	2.16
0.15	0.00	0.03	1.77	60.89	5.85	19.20	19.91	4.09	0.04	4.05	2.86	1.19
0.12	0.01	0.05	1.90	60.89	5.85	19.20	19.91	4.09	0.04	4.05	2.86	1.19
0.14	0.00	0.02	1.78
0.20	0.00	0.02	1.64
0.18	0.00	0.01	1.51
0.19	—	0.03	1.83
0.17	0.00	0.01	1.42
0.18	0.00	0.01	1.28

(統計課・人口労働グループ)