

平成8年度学校保健統計調査結果速報

——本県の児童・生徒 男女とも「足長体型に」——

はじめに

この速報は、平成8年度に文部省が実施した学校保健統計調査の結果のうち、児童、生徒及び幼児の体格及び疾病・異常被患率について、本県の集計結果の一部を文部省の速報のなかから取りまとめたものです。

なお、今回ここに登載した数値は、いずれも概数であり、後日文部省で公表する「平成8年度学校保健統計調査報告書」をもって確定数となりますのでご了承願います。

調査の概要

1 調査の目的

この調査は、児童、生徒及び幼児の発育及び健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象

調査実施学校数、調査対象者数及び抽出率は、第1表のとおりである。

3 調査事項

- (1) 児童、生徒及び幼児の発育状態(身長、体重、座高)
- (2) 児童、生徒及び幼児の健康状態(栄養状態、せき柱・胸郭の疾病・異常の有無、裸眼視力、色覚、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻いん頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及びツベルクリン反応検査)

4 調査期日

平成8年4月から6月の間に実施された学校保健法による健康診断の結果に基づき調査した。

5 調査系統

この調査の調査系統は、次のとおりである。

文部大臣 — 都道府県知事 — 調査実施校の長

6 利用上の注意

年齢は、平成8年4月1日現在の満年齢である。

第1表 茨城県の調査対象者数及び抽出率

区 分	学校数	調 査 対 象 者 数 及 び 抽 出 率 (人, %)			
		発育状態調査	抽 出 率	健康状態調査	抽 出 率
小 学 校	60校	5,549	全児童数の2.7%	10,295	全児童数の5.0%
中 学 校	40校	4,779	全生徒数の4.1%	8,481	全生徒数の7.2%
高 等 学 校	60校	2,697	生徒数(1～3学年)の2.4%	4,020	生徒数(1～3学年)の3.5%
幼 稚 園	35園	1,322	5歳在園児の6.3%	1,599	5歳在園児の7.7%
計	195校	14,347	3.1%	24,395	5.3%

調査結果の概要

A 発育状態

1 身長・体重・座高の茨城県平均値

(1) 身長

男子の身長は、5歳、8歳から10歳及び13歳、14歳、16歳の各年齢で前年度より伸びている。

なお、各年齢間の身長差は、12歳と13歳の間(7.8cm)が最も大きく、16歳と17歳の間(0.5cm)が最も小さくなっているが前年と同様の傾向である。

女子の身長は、5歳、6歳、9歳から11歳、14歳の各年齢で前年度より伸びている。

なお、各年齢間の身長差は、10歳と11歳の間(7.2cm)が最も大きく、15歳と16歳の間(0.3cm)が最も小さくなっている。

9歳から11歳の間で女子の身長は、男子の身長を上回っている。(第2表)

(2) 体重

男子の体重は、5歳、6歳、8歳から14歳及び16歳の各年齢で前年度より増えている。

なお、各年齢間の体重差は、13歳と14歳の間(5.4kg)が最も大きく、16歳と17歳の間(0.2kg)が最も小さくなっている。

女子の体重は、5歳から11歳、14歳、16歳及び17歳の各年齢で前年度より増えている。

なお、各年齢間の体重差は、10歳と11歳の間(5.6kg)が最も大きく、16歳と17歳の間(0.1kg)が最も小さくなっている。

10歳から12歳の間で女子の体重は、男子の体重を上回っている。(第2表)

(3) 座高

男子の座高は、6歳、8歳、10歳、13歳、16歳及び17歳の各年齢で前年度より伸びている。

なお、各年齢間の座高差は、12歳と13歳の間(3.9cm)が最も大きく、16歳と17歳の間(0.5cm)が最も小さくなっている。


女子の座高は、6歳、8歳から11歳の各年齢で前年度より伸びている。

なお、各年齢間の座高差は、10歳と11歳の間(3.5cm)が最も大きく、15歳、16歳、17歳の間が差がなくなっている。

9歳から12歳の間で女子の座高は、男子の座高を上回っている。(第2表)

茨城県の児童・生徒及び幼児の体格は、男女とも体重の伸びに比べると、身長及び座高はそれほど伸びていない。

なお、各年齢間体格の差は、男子では、12歳と13歳の間が最も大きく、女子では、10歳と11歳の間が最も大きくなっている。



■調査から

2 全国平均値との比較

全国平均値と比較してみると、男子・女子ともに身長、体重は全国平均を概ね上回っている。特に、体重の格差については、男子の8歳(1.0kg)、16歳(1.2kg)と、女子の11歳(1.1kg)とかなり上回

っている。

座高について比較してみると、全体的に下回っている。特に、男子では12歳(△0.4cm)、15歳から17歳(△0.3cm)となり、女子では12歳(△0.6cm)、16歳及び17歳(△0.7cm)と下回っている。

第2表 年齢別男女別体格(平成8年度・平成7年度)

区 分	身 長 (cm)			体 重 (kg)			座 高 (cm)					
	8年度	7年度	差	8年度	7年度	差	8年度	7年度	差			
男	幼稚園	5歳	111.1	110.8	0.3	19.6	19.5	0.1	62.3	62.4	△ 0.1	
	小 学 校	6歳	116.9	117.0	△ 0.1	22.3	22.2	0.1	65.2	65.1	0.1	
		7	122.5	122.8	△ 0.3	24.9	24.9	0.0	67.7	67.9	△ 0.2	
		8	128.8	128.3	0.5	28.7	28.0	0.7	70.7	70.6	0.1	
		9	133.8	133.7	0.1	31.9	31.5	0.4	72.8	72.8	0.0	
		10	139.2	138.9	0.3	35.3	34.9	0.4	75.2	75.1	0.1	
	高 等 学 校	11	144.8	145.2	△ 0.4	39.9	39.5	0.4	77.6	77.6	0.0	
		12歳	152.0	152.2	△ 0.2	45.0	44.4	0.6	80.7	80.8	△ 0.1	
		13	159.8	159.7	0.1	50.3	50.0	0.3	84.6	84.5	0.1	
		14	165.5	165.3	0.2	55.7	55.1	0.6	87.7	87.8	△ 0.1	
		15歳	168.9	169.0	△ 0.1	59.8	60.4	△ 0.6	89.5	89.6	△ 0.1	
	女	幼稚園	5歳	110.3	110.3	0.0	19.5	19.2	0.3	61.8	62.0	△ 0.2
			6歳	116.3	116.1	0.2	22.1	21.6	0.5	65.0	64.7	0.3
		小 学 校	7	121.8	122.0	△ 0.2	24.4	24.2	0.2	67.4	67.5	△ 0.1
8			127.5	127.6	△ 0.1	27.5	27.1	0.4	70.2	70.0	0.2	
9			133.9	133.6	0.3	31.3	30.9	0.4	73.2	72.8	0.4	
10			140.3	139.9	0.4	35.5	34.8	0.7	76.1	75.8	0.3	
11			147.5	146.5	1.0	41.1	40.3	0.8	79.6	79.1	0.5	
高 等 学 校		12歳	151.7	152.3	△ 0.6	45.5	45.5	0.0	81.6	82.3	△ 0.7	
		13	155.1	155.2	△ 0.1	48.3	48.3	0.0	83.6	83.7	△ 0.1	
		14	156.7	156.7	0.0	51.3	51.0	0.3	84.5	84.5	0.0	
	15歳	157.4	157.6	△ 0.2	52.6	53.5	△ 0.9	84.6	84.7	△ 0.1		
	16	157.7	157.9	△ 0.2	53.7	53.4	0.3	84.6	85.0	△ 0.4		
17	158.1	158.2	△ 0.1	53.8	53.7	0.1	84.6	85.2	△ 0.6			

このことから、本県の児童・生徒の体型は、男子・女子ともに現代を代表する「足長スタイル指向」と言えそうである。(第3表)

第3表 年齢別男女別体格（茨城県・全国）

区 分	身 長 (cm)			体 重 (kg)			座 高 (cm)				
	茨城県	全 国	差	茨城県	全 国	差	茨城県	全 国	差		
男	幼稚園	5歳	111.1	110.8	0.3	19.6	19.3	0.3	62.3	62.3	0.0
	小 学 校	6歳	116.9	116.7	0.2	22.3	21.8	0.5	65.2	65.2	0.0
		7	122.5	122.5	0.0	24.9	24.4	0.5	67.7	67.8	△ 0.1
		8	128.8	128.2	0.6	28.7	27.7	1.0	70.7	70.4	0.3
		9	133.8	133.5	0.3	31.9	31.1	0.8	72.8	72.9	△ 0.1
		10	139.2	138.8	0.4	35.3	34.8	0.5	75.2	75.1	0.1
		11	144.8	144.9	△ 0.1	39.9	39.0	0.9	77.6	77.7	△ 0.1
	中 学 校	12歳	152.0	152.1	△ 0.1	45.0	44.5	0.5	80.7	81.1	△ 0.4
		13	159.8	159.6	0.2	50.3	49.9	0.4	84.6	84.6	0.0
		14	165.5	165.2	0.3	55.7	54.9	0.8	87.7	87.6	0.1
	高 等 学 校	15歳	168.9	168.4	0.5	59.8	59.7	0.1	89.5	89.8	△ 0.3
		16	170.3	170.1	0.2	62.7	61.5	1.2	90.4	90.7	△ 0.3
		17	170.8	170.9	△ 0.1	62.9	63.1	△ 0.2	90.9	91.2	△ 0.3
	女	幼稚園	5歳	110.3	110.1	0.2	19.5	19.0	0.5	61.8	61.8
小 学 校		6歳	116.3	115.9	0.4	22.1	21.3	0.8	65.0	64.8	0.2
		7	121.8	121.7	0.1	24.4	23.9	0.5	67.4	67.5	△ 0.1
		8	127.5	127.6	△ 0.1	27.5	27.1	0.4	70.2	70.2	0.0
		9	133.9	133.5	0.4	31.3	30.6	0.7	73.2	73.0	0.2
		10	140.3	140.2	0.1	35.5	34.9	0.6	76.1	76.1	0.0
		11	147.5	146.9	0.6	41.1	40.0	1.1	79.6	79.5	0.1
中 学 校		12歳	151.7	152.0	△ 0.3	45.5	44.7	0.8	81.6	82.2	△ 0.6
		13	155.1	155.1	0.0	48.3	48.1	0.2	83.6	83.8	△ 0.2
		14	156.7	156.7	0.0	51.3	50.6	0.7	84.5	84.6	△ 0.1
高 等 学 校		15歳	157.4	157.4	0.0	52.6	52.3	0.3	84.6	85.1	△ 0.5
		16	157.7	157.9	△ 0.2	53.7	53.3	0.4	84.6	85.3	△ 0.7
		17	158.1	158.1	0.0	53.8	53.2	0.6	84.6	85.3	△ 0.7

(注) 差は茨城県－全国の値 △はマイナスを表わし、全国より小さいことを示す。

■調査から

3 親の世代(昭和41年度)との比較

子供たちの親の世代である30年前(昭和41年度)と比較してみると、1歳ほど成長が早まっている。

最も体格差のある年齢は、男子の場合13歳(中学2年生)で、身長が8.5cm、体重が8.8kg、座高が3.1cmと大きくなっている。女子の場合は11歳(小学6

年生)で、身長が8.0cm、体重が7.5kg、座高が3.2cm大きくなっている。


身長から座高を引いた足の長さについては、13歳男子で5.4cm、11歳女子で4.8cm親の世代より長い。身長の伸びの多くの部分は、足の長さの伸びによるものとなっている。(第4表、第1図)

第4表 年齢別男女別体格(平成8年度・昭和41年度)

区 分		身 長 (cm)			体 重 (kg)			座 高 (cm)			
		8年度	41年度	差	8年度	41年度	差	8年度	41年度	差	
男	幼稚園	5歳	111.1	108.8	2.3	19.6	18.2	1.4	62.3	61.8	0.5
	小 学 校	6歳	116.9	113.2	3.7	22.3	19.6	2.7	65.2	64.0	1.2
		7	122.5	118.4	4.1	24.9	21.8	3.1	67.7	66.5	1.2
		8	128.8	123.7	5.1	28.7	24.3	4.4	70.7	68.9	1.8
		9	133.8	128.5	5.3	31.9	26.4	5.5	72.8	71.0	1.8
		10	139.2	133.3	5.9	35.3	29.2	6.1	75.2	73.1	2.1
		11	144.8	137.9	6.9	39.9	32.1	7.8	77.6	75.0	2.6
	中 学 校	12歳	152.0	144.2	7.8	45.0	36.1	8.9	80.7	77.9	2.8
		13	159.8	151.3	8.5	50.3	41.5	8.8	84.6	81.5	3.1
		14	165.5	158.1	7.4	55.7	47.1	8.6	87.7	85.0	2.7
	高 等 学 校	15歳	168.9	163.5	5.4	59.8	52.5	7.3	89.5	88.4	1.1
		16	170.3	165.7	4.6	62.7	55.4	7.3	90.4	89.4	1.0
		17	170.8	166.6	4.2	62.9	57.1	5.8	90.9	90.2	0.7
	女	幼稚園	5歳	110.3	107.8	2.5	19.5	17.6	1.9	61.8	61.3
小 学 校		6歳	116.3	111.7	4.6	22.1	19.1	3.0	65.0	63.4	1.6
		7	121.8	117.5	4.3	24.4	21.2	3.2	67.4	66.0	1.4
		8	127.5	123.2	4.3	27.5	23.5	4.0	70.2	68.5	1.7
		9	133.9	127.9	6.0	31.3	26.1	5.2	73.2	70.8	2.4
		10	140.3	133.7	6.6	35.5	29.4	6.1	76.1	73.5	2.6
		11	147.5	139.5	8.0	41.1	33.6	7.5	79.6	76.4	3.2
中 学 校		12歳	151.7	146.0	5.7	45.5	38.5	7.0	81.6	79.9	1.7
		13	155.1	149.7	5.4	48.3	42.7	5.6	83.6	82.2	1.4
		14	156.7	152.0	4.7	51.3	46.3	5.0	84.5	83.7	0.8
高 等 学 校		15歳	157.4	153.6	3.8	52.6	49.1	3.5	84.6	84.8	△ 0.2
		16	157.7	154.3	3.4	53.7	50.5	3.2	84.6	85.1	△ 0.5
		17	158.1	154.4	3.7	53.8	51.2	2.6	84.6	85.0	△ 0.4

第1図 年齢別男女別体格の親の世代との比較

— 平成8年度
 - - - 昭和41年度



■ 調査から

B 健康状態

1 う歯（むし歯）の被患率

疾病・異常の被患率等の中で最も高いものはう歯（むし歯）で、幼稚園82.3%，小学校87.7%，

中学校84.9%，高等学校91.9%となっている。

この結果を前年度と比較すると、小学校で1.1ポイント、中学校で1.5ポイント、高等学校で2.2ポイントそれぞれ低下しているが、幼稚園は、8.3ポイント上昇している。

第5表 疾病・異常被患率等
〔茨城県〕

区分	裸眼視力				色覚異常	難聴	眼		耳疾患	
	計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			伝染性疾患	眼疾患・異常 その他の		
幼稚園	計	7.21	5.35	1.62	0.23	…	…	0.08	1.02	0.30
	男	7.02	4.88	1.91	0.23	…	…	—	1.11	0.59
	女	7.40	5.85	1.33	0.23	…	…	0.17	0.92	—
小学校	計	23.26	9.21	8.55	5.50	1.87	1.04	—	0.82	0.83
	男	20.29	8.25	7.21	4.83	3.47	1.04	—	0.93	0.77
	女	26.37	10.22	9.96	6.19	0.15	1.04	—	0.71	0.89
中学校	計	47.19	12.71	16.19	18.29	…	0.37	0.01	0.74	0.27
	男	41.36	11.56	15.01	14.80	…	0.35	0.02	0.75	0.30
	女	53.32	13.93	17.43	21.96	…	0.39	—	0.73	0.24
高等学校	計	62.95	10.74	17.35	34.87	…	0.61	—	0.64	0.41
	男	55.79	10.77	17.72	27.30	…	0.74	—	0.74	0.77
	女	70.09	10.71	16.97	42.40	…	0.49	—	0.55	0.04

〔全 国〕

区分	裸眼視力				色覚異常	難聴	眼		耳疾患	
	計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			伝染性疾患	眼疾患・異常 その他の		
幼稚園	計	21.38	15.36	5.55	0.46	…	…	0.20	1.17	1.65
	男	20.35	14.69	5.16	0.50	…	…	0.21	1.34	1.70
	女	22.44	16.05	5.96	0.42	…	…	0.19	0.99	1.59
小学校	計	25.81	10.33	9.64	5.84	2.15	1.00	0.12	3.24	3.58
	男	23.00	9.55	8.55	4.90	3.95	0.99	0.14	3.45	3.72
	女	28.75	11.15	10.79	6.82	0.27	1.01	0.11	3.03	3.42
中学校	計	49.83	12.03	16.61	21.19	…	0.65	0.09	3.25	1.89
	男	45.00	11.75	15.92	17.33	…	0.63	0.11	3.58	2.23
	女	54.88	12.32	17.33	25.23	…	0.67	0.06	2.92	1.54
高等学校	計	62.67	11.87	16.97	33.83	…	0.54	0.08	2.24	0.85
	男	59.41	12.01	17.69	29.71	…	0.60	0.09	2.46	0.94
	女	65.95	11.72	16.24	37.98	…	0.49	0.07	2.02	0.75

〔注〕 表に使用している記号：「0.00」……計数が0ではないが、表示単位未満の場合 「—」……計数が0の場合 「…」……調査対象とならなかった場合

全国と比較すると、幼稚園は8.6ポイント、小学校は2.0ポイント、中学校は0.1ポイント、高等学校は1.8ポイントそれぞれ全国を上回っている

(第5表)

(単位：%)

鼻 咽 頭		歯 ・ 口 腔					結 核	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者
鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 患 ・ 咽 頭 ・ 喉 頭 異 常	歯				口 疾 病 ・ 異 常 の 患				
		う 歯 (むし歯)			そ の 他 の 患					
		計	処 置 完 了 者	未 処 置 歯 の 有 る 者						
0.04	2.82	82.30	26.09	56.21	2.28	0.37	…	0.05	…	0.35
0.08	2.44	81.94	24.44	57.51	2.43	0.21	…	—	…	0.32
—	3.22	82.68	27.82	54.86	2.13	0.55	…	0.11	…	0.37
2.02	4.08	87.74	36.78	50.96	15.68	1.05	…	0.18	0.04	1.36
2.64	4.21	87.74	35.83	51.92	16.49	1.21	…	0.14	0.08	1.65
1.37	3.94	87.74	37.78	49.97	14.83	0.88	…	0.21	—	1.05
2.02	1.40	84.87	45.02	39.85	9.33	0.13	…	0.77	0.19	…
2.27	1.26	81.76	43.19	38.57	9.53	0.15	…	0.81	0.17	…
1.77	1.53	88.13	46.93	41.20	9.11	0.11	…	0.73	0.21	…
2.17	0.85	91.86	50.79	41.08	4.96	0.99	0.05	0.40	0.07	…
2.51	0.76	91.60	47.70	43.90	5.50	0.46	0.11	0.40	0.12	…
1.82	0.94	92.13	53.86	38.27	4.42	1.51	—	0.40	0.03	…

(単位：%)

鼻 咽 頭		歯 ・ 口 腔					結 核	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者
鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 患 ・ 咽 頭 ・ 喉 頭 異 常	歯				口 疾 病 ・ 異 常 の 患				
		う 歯 (むし歯)			そ の 他 の 患					
		計	処 置 完 了 者	未 処 置 歯 の 有 る 者						
2.65	3.60	73.72	28.03	45.69	2.35	0.43	…	0.50	…	1.29
3.38	4.05	73.79	27.90	45.89	2.25	0.40	…	0.51	…	1.39
1.91	3.15	73.65	28.17	45.49	2.44	0.46	…	0.49	…	1.18
10.03	2.33	85.73	41.08	44.65	13.09	0.67	0.01	0.64	0.08	2.55
12.20	2.49	85.86	40.00	45.85	13.15	0.67	0.01	0.47	0.07	2.81
7.76	2.16	85.60	42.20	43.39	13.03	0.67	0.01	0.82	0.09	2.29
7.84	1.15	84.77	46.13	38.64	11.91	0.64	0.02	1.90	0.16	…
9.32	1.24	83.02	44.49	38.53	12.74	0.69	0.02	2.19	0.14	…
6.30	1.06	86.60	47.85	38.75	11.04	0.59	0.01	1.61	0.17	…
5.88	0.76	90.08	50.63	39.45	8.59	0.78	0.02	1.78	0.24	…
6.59	0.79	88.19	46.78	41.41	8.87	0.75	0.03	2.01	0.22	…
5.17	0.74	91.98	54.51	37.47	8.32	0.81	0.02	1.55	0.26	…

■ 調査から

2 裸眼視力1.0未満の被患率

う歯（むし歯）の次に疾病・異常の被患率の高いのが、教室の後ろの席では黒板の字が見えにくい「裸眼視力1.0未満の者」で、小学校23.3%，中学校47.2%，高等学校63.0%の順となっており、

学校段階が進むにつれ高くなっている。

特に、高等学校では「裸眼視力1.0未満の者」が60%以上であり、その中でも眼鏡などが欠かせない「0.3未満の者」が34.9%と30%を超える状況になっている。

第5表 疾病・異常被患率等（つづき）

〔茨城県〕

区分	栄養状態		せき柱・胸郭				伝染性皮膚疾患	心臓疾病・異常	心電図異常	ぜん息	腎臓疾患
	栄養不良	肥満傾向	計	せき柱側わ	ん症・せき柱側わ	その他のせき柱疾病・異常					
幼稚園	計	—	0.69	0.25	0.05	0.21	0.15	0.42	…	1.15	—
	男	—	0.62	0.09	—	0.09	0.10	0.49	…	1.45	—
	女	—	0.76	0.42	0.10	0.32	0.21	0.34	…	0.83	—
小学校	計	0.18	4.77	0.32	0.12	0.20	0.14	0.43	2.33	0.86	0.03
	男	0.19	5.69	0.40	0.18	0.22	0.18	0.37	3.05	1.01	0.02
	女	0.16	3.81	0.24	0.05	0.19	0.08	0.49	1.56	0.70	0.04
中学校	計	0.08	2.19	0.46	0.31	0.15	0.04	0.38	2.40	1.55	0.05
	男	0.07	2.50	0.57	0.38	0.20	0.08	0.47	3.26	1.87	0.09
	女	0.08	1.87	0.34	0.24	0.10	—	0.29	1.51	1.22	0.02
高等学校	計	—	0.46	0.46	0.33	0.13	—	0.58	2.98	0.83	0.02
	男	—	0.35	0.41	0.25	0.26	—	0.78	2.82	0.68	—
	女	—	0.58	0.50	0.40	0.10	—	0.38	3.14	0.98	0.05

〔全 国〕

（単位：％）

区分	栄養状態		せき柱・胸郭				伝染性皮膚疾患	心臓疾病・異常	心電図異常	ぜん息	腎臓疾患
	栄養不良	肥満傾向	計	せき柱側わ	ん症・せき柱側わ	その他のせき柱疾病・異常					
幼稚園	計	0.02	0.72	0.32	0.07	0.24	0.44	0.40	…	1.02	0.02
	男	0.02	0.69	0.40	0.08	0.31	0.52	0.39	…	1.30	0.01
	女	0.02	0.74	0.23	0.06	0.17	0.35	0.41	…	0.72	0.02
小学校	計	0.07	2.81	0.33	0.12	0.20	0.11	0.50	2.03	1.59	0.11
	男	0.06	3.43	0.37	0.12	0.25	0.14	0.50	2.33	1.91	0.11
	女	0.08	2.16	0.28	0.12	0.16	0.08	0.49	1.72	1.25	0.10
中学校	計	0.13	1.82	0.51	0.33	0.18	0.01	0.54	2.60	1.48	0.17
	男	0.13	1.95	0.46	0.22	0.25	0.02	0.56	2.93	1.79	0.16
	女	0.12	1.68	0.55	0.45	0.10	0.01	0.52	2.25	1.15	0.18
高等学校	計	0.17	1.43	0.34	0.22	0.12	0.00	0.55	2.64	0.83	0.14
	男	0.22	1.37	0.35	0.15	0.20	0.00	0.57	3.10	0.88	0.15
	女	0.13	1.50	0.32	0.29	0.03	—	0.54	2.17	0.78	0.12

「裸眼視力1.0未満の者」の被患率を前年度と比較すると、中学校で1.0ポイント、高等学校も1.0ポイントそれぞれ低下しているが、小学校は0.2ポイント上昇している。

校も2.6ポイントそれぞれ全国を下回っているが、高等学校は0.3ポイント上回っている。(第5表)

(統計課・人口労働グループ)

全国と比較すると、小学校は2.6ポイント、中学

(単位：%)

寄生虫病	言語障害	その他異常	ツベルクリン反応			永久歯の1人当たり平均う歯(むし歯)等数				
			陽性	結核の精密検査の対象者	陰性	計(本)	喪失歯数(本)	う歯(むし歯)		
								計(本)	処置歯数(本)	未処置歯数(本)
0.05	0.25	0.53
—	0.39	1.04
0.10	0.12	—
—	0.07	3.24	40.36	0.97	59.64
—	0.11	3.61	35.08	0.49	64.92
—	0.02	2.85	45.96	1.47	54.04
0.04	0.01	1.47	65.62	6.07	34.38	3.72	0.04	3.68	2.74	0.94
0.06	—	1.56	65.50	4.43	34.50	3.32	0.03	3.29	2.40	0.89
0.03	0.02	1.37	65.74	7.76	34.26	4.13	0.05	4.08	3.08	1.00
—	—	0.90
—	—	0.41
—	—	1.39

(単位：%)

寄生虫病	言語障害	その他異常	ツベルクリン反応			永久歯の1人当たり平均う歯(むし歯)等数				
			陽性	結核の精密検査の対象者	陰性	計(本)	喪失歯数(本)	う歯(むし歯)		
								計(本)	処置歯数(本)	未処置歯数(本)
0.06	0.20	2.24
0.07	0.29	2.46
0.06	0.11	2.02
0.02	0.09	2.90	39.26	1.00	60.74
0.02	0.11	2.97	35.96	0.74	64.04
0.02	0.07	2.83	42.73	1.28	57.27
0.00	0.04	1.86	65.67	5.91	34.33	3.51	0.04	3.46	2.56	0.90
0.00	0.05	1.92	65.43	5.50	34.57	3.21	0.04	3.18	2.31	0.87
0.00	0.03	1.79	65.91	6.33	34.09	3.81	0.05	3.77	2.82	0.94
—	0.01	1.88
—	0.01	1.65
—	0.01	2.10

〔付 表〕年齢別体格の推移（茨城県）

区 分			幼稚園	小 学				
			5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	
身 長	男	昭和 41 年度	108.8	113.2	118.4	123.7	128.5	
		51	110.0	115.2	120.9	126.2	130.9	
		61	111.0	116.6	122.4	128.0	133.2	
		平成 8 年度	111.1	116.9	122.5	128.8	133.8	
	女	昭和 41 年度	107.8	111.7	117.5	123.2	127.9	
		51	108.8	114.0	120.3	125.6	131.0	
		61	109.9	115.7	121.3	127.2	133.0	
		平成 8 年度	110.3	116.3	121.8	127.5	133.9	
体 重	男	昭和 41 年度	18.2	19.6	21.8	24.3	26.4	
		51	18.5	20.7	23.1	26.0	28.7	
		61	19.5	21.8	24.1	27.0	30.2	
		平成 8 年度	19.6	22.3	24.9	28.7	31.9	
	女	昭和 41 年度	17.6	19.1	21.2	23.5	26.1	
		51	18.4	20.3	23.1	25.5	28.3	
		61	19.0	21.2	23.2	26.5	30.2	
		平成 8 年度	19.5	22.1	24.4	27.5	31.3	
座 高	男	昭和 41 年度	61.8	64.0	66.5	68.9	71.0	
		51	62.1	64.6	67.1	69.7	71.7	
		61	62.7	65.4	68.0	70.4	72.5	
		平成 8 年度	62.3	65.2	67.7	70.7	72.8	
	女	昭和 41 年度	61.3	63.4	66.0	68.5	70.8	
		51	61.7	63.9	66.7	69.2	71.5	
		61	62.1	64.8	67.5	70.1	72.6	
		平成 8 年度	61.8	65.0	67.4	70.2	73.2	

校		中 学 校			高 等 学 校		
10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
133.3	137.9	144.2	151.3	158.1	163.5	165.7	166.6
136.7	142.2	148.6	155.7	161.9	165.9	167.8	168.8
137.9	143.7	150.4	157.9	164.0	167.8	169.1	170.0
139.2	144.8	152.0	159.8	165.5	168.9	170.3	170.8
133.7	139.5	146.0	149.7	152.0	153.6	154.3	154.4
137.7	144.2	149.3	153.1	154.6	155.6	156.0	156.3
139.3	145.5	151.2	154.5	156.1	156.8	157.3	157.5
140.3	147.5	151.7	155.1	156.7	157.4	157.7	158.1
29.2	32.1	36.1	41.5	47.1	52.5	55.4	57.1
32.1	35.5	40.5	45.5	51.0	55.9	57.9	59.2
33.3	37.5	42.9	48.3	53.6	59.6	60.9	61.9
35.3	39.9	45.0	50.3	55.7	59.8	62.7	62.9
29.4	33.6	38.5	42.7	46.3	49.1	50.5	51.2
32.6	37.2	42.0	46.3	49.3	51.2	52.1	52.5
33.9	39.1	44.2	47.7	50.3	52.6	53.5	53.0
35.5	41.1	45.5	48.3	51.3	52.6	53.7	53.8
73.1	75.0	77.9	81.5	85.0	88.4	89.4	90.2
74.0	76.7	79.1	82.8	86.0	88.8	89.8	90.6
74.4	77.0	80.1	83.6	87.0	89.1	89.5	90.5
75.2	77.6	80.7	84.6	87.7	89.5	90.4	90.9
73.5	76.4	79.9	82.2	83.7	84.8	85.1	85.0
74.6	77.8	80.7	82.8	83.9	85.1	85.2	85.2
75.4	78.6	81.6	83.3	84.2	84.7	84.6	84.9
76.1	79.6	81.6	83.6	84.5	84.6	84.6	84.6