

# 水稲生育管理情報（6月9日）

## 気象と生育の概況

6月に入ってから、平均気温は平年より高く、日照時間はやや少なめで推移しています。このため、前回調査時に比べ茎数は著しく増加しています。

## これからの栽培管理

- ・常陸大宮市野口では茎数が330本/m<sup>2</sup>を超え、中干しの開始時期に入っています。こまめに茎数を数えて、中干しの時期を逃さないよう注意しましょう。
- ・管内北部地域や田植えが遅い圃場で、茎数が330本/m<sup>2</sup>に満たない場合は、引き続き浅水管理を行い茎数確保に努めてください。

	栽植密度 (株/坪)	コシヒカリ	ふくまる (家庭精米向け)	ふくまる (中食・外食向け)
	中干し開始時期	50 60	22~23本/株 18~19本/株	25本/株 21本/株
目標とする茎数		330~350本/m <sup>2</sup>	380本/m <sup>2</sup>	400~430本/m <sup>2</sup>

## 中干しについて

### 1. 効果

- ① 茎数増加を制限する ⇒ 大粒の米、倒伏防止、いもち発生予防の効果！
- ② 田面が固まり、倒伏しにくくなる その後の管理作業も楽になります！
- ③ 有害ガスの除去で根を健康に保つ（生ワラを入れた田は十分に実施する）

### 2. 方法

程度： 田面にヒビが入るくらい。溝を切るのも効果的。

期間： 10日以上（葉色や茎数の増加具合、天候により調節する）

### 3. 終了の目安

カラスケールで4~4.5と葉色が淡くなってきたら終了時期です。

中干し終了後は3~4日間隔で入水と自然落水を繰り返す「間断かんがい」を実施してください。

調査地点	品種名	移植日	茎数(本/m <sup>2</sup> )		これからの 管理	草丈(cm)		葉色	
			本年	昨年		本年	昨年	本年	昨年
常陸大宮市 野口平	コシヒカリ	4月28日	526	575	すぐ中干し！ 浅水を継続	42	41	4.6	4.1
大子町 浅川	コシヒカリ	5月10日	234	303		34	36	4.3	4.0