

令和8年度水稻定点圃場の生育状況


令和8年7月24日

茨城県県南農林事務所


稲敷地域農業改良普及センター

1. 本年の気象状況 [4 下旬～7 月中旬]

平均気温の推移（龍ヶ崎アメダス）



積算日照時間、降水量の推移（龍ヶ崎アメダス）



- ・ 4 月下旬は雨が多く、やや低温、やや低日照で推移。
- ・ 5 月は上旬～下旬にかけてやや高温で推移し、5 月中旬は雨がなく、多照傾向となった。
- ・ 6 月 7 日から本格的な梅雨に入り、6 月上旬～7 月上旬にかけて、低温で推移し、雨が多く、低日照傾向となった。
- ・ 7 月中旬は、高温・やや多照傾向となり、7 月 20 日に梅雨明けとなった。
- ・ 4 月下旬～7 月中旬までの積算平均気温は平年差 - 0.3℃、積算日照時間は平年比 96%、積算降水量は平年比 117%。

2. 本年の生育状況

●あきたこまち定点圃場

調査地点	年度	田植日	栽植密度		調査日	草丈	茎数	葉色	SPAD	出穂期	成熟期 予測
			(株/㎡)	(株/坪)		(cm)	(本/㎡)				
稲敷市 南太田 (定点)	R8	4月19日	15.7	52	7月21日	104.8	449	4.4	39.1	7月14日	8月19日 (予測)
	平年 R3-R7	4月23日	16.3	54	7月20日	102.6	417	4.3	37.9	7月11日	8月20日 (実測)
稲敷市 下須田 (定点)	R8	4月25日	17.5	58	7月21日	101.1	478	4.9	41.4	7月15日	8月20日 (予測)
	平年 R3-R7	4月26日	15.3	51	7月20日	105.7	425	4.4	38.5	7月12日	8月21日 (実測)

< 7月21日調査の結果 >

- ・ 平年に比べ、草丈は平年並み～やや短い。茎数はやや多い。葉色は平年並み～やや濃い。
- ・ 出穂期は平年より3日遅くなった。
- ・ 南太田定点は、田植日 4/19 で出穂期 7/14 となり、成熟期は 8/19 頃と予測。
- ・ 下須田定点は、田植日 4/25 で出穂期 7/15 となり、成熟期は 8/20 頃と予測。

※成熟期は県農業研究所の生育予測ファイルで算出。平年より高温の気温で推移した場合、これより早まる可能性がある。

●コシヒカリ定点圃場

調査地点	年度	田植日	栽植密度		調査日	草丈	茎数	葉色	SPAD	出穂期 予測	成熟期 予測
			(株/㎡)	(株/坪)		(cm)	(本/㎡)				
稲敷市 浮島 (定点)	R8	5月8日	15.3	50	7月21日	91.9	414	3.6	32.8	7月24日 (予測)	9月1日 (予測)
	平年 R3-R7	5月1日	16.5	54	7月20日	95.8	450	3.5	32.4	7月26日 (実測)	8月31日 (実測)
龍ヶ崎市 塗戸町 (定点)	R8	5月19日	22.2	73	7月21日	92.8	562	3.3	31.2	8月3日 (予測)	9月12日 (予測)
	平年 R3-R7	5月21日	20.9	69	7月20日	91.5	512	3.4	31.9	8月4日 (実測)	9月13日 (実測)
美浦村 木原 (定点)	R8	5月7日	16.4	54	7月21日	98.0	449	4.0	34.3	7月24日 (予測)	9月1日 (予測)
	平年 R1-R5	5月7日	15.8	52	7月20日	90.0	428	3.3	33.4	7月30日 (実測)	9月6日 (実測)

※美浦村木原定点の平年値は、令和6,7年の田植日が遅かったため、R1-R5の平年値。

< 7月21日調査の結果 >

- ・ 平年に比べ、草丈はやや短い～やや長い。茎数はやや少ない～やや多い。葉色は平年並み～やや濃い。
- ・ 出穂期は幼穂長から平年より1～2日早く、成熟期は1日遅い～5日早いと予測。

※成熟期は県農業研究所の生育予測ファイルで算出。平年より高温の気温で推移した場合、これより早まる可能性がある。