

大豆の生育状況（8月28日現在、水戸市）

地域名	品種	生育ステージ	対平年遅速	生育（作柄・品質）概況等	これまでに講じた対策 及び今後の方針
水 戸	里のほほえみ	粒肥大期	1 日早い （開花期）	1)気象概況（8月2日～8月28日） 平均気温は28.1℃で平年よりやや高かった（平年差+0.6℃）。日照時間は205.8時間で平年並だった（平年比107%）。降水量は120.5mmで平年並だった（平年比89%）。 （水戸地方気象台観測値。平年値は直近5ヶ年の平均値。別紙に図示。）	・紫斑病・英害虫の防除を実施した。 （7月8、17、30日、8月5、15日）
	納豆小粒	粒肥大期	1 日早い （開花期）	2)生育概況 「里のほほえみ」は平年に比べて、主茎長は平年並、主茎節数はやや多く、分枝数はかなり少なく、茎の太さはかなり太く、地上部生体重は平年並だった。一株英数はやや少なく、一株英重、一英重は軽かった。 「納豆小粒」は平年に比べて、主茎長は平年並、主茎節数はかなり少なく、分枝数はやや少なく、茎の太さはかなり太く、地上部生体重は平年並だった。一株英数はかなり多く、一株英重はやや重く、一英重は平年並だった。	・カメムシ類、シロイチモジマダラメイガ等の英害虫やハスモンヨトウを適宜防除する。

表 畑における生育(水戸市 茨城県農総セ農研 作物研究室)

品種名	開花期			主茎長			主茎節数			分枝数			茎の太さ			地上部生体重		
	本年 (月日)	前年値 (月日)	平年値 (月日)	本年 (cm)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (節)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (本/株)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (mm)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (g/株)	前年比 (%)	平年比 (%)
里のほほえみ	7.30	7.30	7.31	55.4	94	99	13.3	99	102	3.5	83	77	11.9	105	112	237.3	68	91
納豆小粒	8.7	8.7	8.8	77.9	111	104	16.2	100	96	5.9	92	90	11.4	101	115	263.4	80	100

品種名	一株英数			一株英重			一英重		
	本年 (英/株)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (g/株)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (g/英)	前年比 (%)	平年比 (%)
里のほほえみ	65.5	79	92	44.2	68	80	0.70	89	90
納豆小粒	178.8	186	139	18.8	145	126	0.10	74	90

耕種概要 1) 圃場（来歴）：表層腐植質黒ボク土
3) 施肥量：N-P2O5-K2O＝0.3-1.0-1.0kg/a
5) 茎の太さ：第1節(子葉節)と第2節(初生葉節)の節間で測定。




2) 播種日：6月19日
4) 平年値：令和2年～令和6年の平均
6) 中耕培土：7月17日に実施。



里のほほえみ（8月28日撮影）



納豆小粒（8月28日撮影）



令和7年半旬別気象経過図

（水戸地方気象台データを参考に作成。平年値は直近5年間の平均値。）