

大豆の生育状況（8月28日現在、水戸市）

地域名	品種	生育ステージ	対平年遅速	生育（作柄・品質）概況等	これまでに講じた対策 及び今後の方針
水 戸	里のほほえみ	粒肥大期	2日遅い （開花期）	1）気象概況（7月30日～8月28日） 平均気温は26.0℃で平年よりかなり低かった（平年差－1.6℃）。日照時間は177.1時間で平年より短かった（平年比85%）。降水量は98.5mmで平年よりやや少なかった（平年比64%）。 （水戸地方気象台観測値。平年値は直近5ヶ年の平均値。別紙に図示。）	・紫斑病・英害虫の防除を実施した。 （7月8、21、30日、8月10、18日）
	納豆小粒	英伸長期～ 粒肥大期	平年並 （開花期）	2）生育概況 「里のほほえみ」は平年に比べて、主茎長はかなり長く、主茎節数、分枝数はかなり多く、茎の太さはかなり太く、地上部生体重は平年並だった。一株英数はやや多く、一株英重は平年並、一英重はやや軽かった。 「納豆小粒」は平年に比べて、主茎長はかなり長く、主茎節数、分枝数はかなり多く、茎の太さはやや太く、地上部生体重は重かった。一株英数はかなり多く、一株英重はかなり重く、一英重は平年並だった。	・カメムシ類、シロイチモジマダラメイガ等の英害虫やハスモンヨトウを適宜防除する。

表 畑における生育(水戸市 茨城県農総セ農研 作物研究室)

品種名	開花期			主茎長			主茎節数			分枝数			茎の太さ			地上部生体重		
	本年 (月日)	前年値 (月日)	平年値 (月日)	本年 (cm)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (節)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (本/株)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (mm)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (g/株)	前年比 (%)	平年比 (%)
里のほほえみ	8.2	7.30	7.31	62.3	112	115	13.8	104	106	5.0	143	116	12.4	104	113	268.8	113	104
納豆小粒	8.9	8.7	8.9	88.7	114	119	18.4	114	110	8.0	136	133	10.8	95	105	296.1	112	114

品種名	一株英数			一株英重			一英重		
	本年 (英/株)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (g/株)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (g/英)	前年比 (%)	平年比 (%)
里のほほえみ	75.1	115	106	50.1	113	98	0.67	96	92
納豆小粒	181.4	101	140	21.4	114	149	0.12	120	113


耕種概要 1）圃場（来歴）：表層腐植質黒ボク土
3）施肥量：N-P₂O₅-K₂O＝0.3-1.0-1.0kg/a
5）茎の太さ：第1節(子葉節)と第2節(初生葉節)の節間で測定。
2）播種日：6月17日
4）平年値：令和3年～令和7年の平均
6）中耕培土：7月22日



里のほほえみ（8月28日撮影）



納豆小粒（8月28日撮影）



令和8年半旬別気象経過図

（水戸地方気象台データを参考に作成。平年値は直近5年間の平均値。）