

# 農 研 速 報

2025年5月2日 発行  
 茨城県農業総合センター農業研究所水田利用研究室  
 〒301-0816 茨城県龍ヶ崎市大徳町 3974  
 TEL:0297-62-0206 FAX:0297-64-0667

麦の生育状況(4月28日現在、龍ヶ崎市)

地域名	麦種(品種)	生育ステージ	対平年遅速	生育(作柄・品質)概況	備考
茨城県 (龍ヶ崎市)	11月14日播種 小麦 (さとのそら)	開花期～乳熟期	3日遅い	龍ヶ崎市における、3月第6半旬～4月第5半旬の気象と麦類生育概況は、下記のとおりである。 <b>【気象】</b> 気温:平均気温はやや高かった(平年比+0.7℃、図1)。 降水量:平年比83%とやや少なかった(図2)。 日照時間:平年比93%とやや短かった(図3)。 <b>【出穂期】</b> 六条大麦は平年並～3日早く、二条大麦は1日遅かった。小麦は、3～5日遅かった(表1)。 <b>【予測成熟期】</b> 大麦:今後の平均気温が平年並に推移した場合、「カシマムギ」は平年より2日早く、「カシマゴール」、「ミカモゴールデン」は平年並で、「キラリモチ」は5月18日の見込みである(表2)。 小麦:今後の平均気温が平年並に推移した場合、2～3日遅くなる見込みである(表2)。 <b>【注釈】</b> 対平年遅速は、予測成熟期と平年値の差による。	<b>◆コンバイン収穫の適期</b> ・成熟期2～3日後から5日間 ・小麦・六条大麦:穀粒水分 30%以下 ・二条大麦:穀粒水分 25%以下 <b>【収穫適期の目安(出穂期後日数)】</b> ・小麦:48～50日 ・六条大麦:約44日 ・二条大麦:約41日 <b>◆早刈りや刈り遅れは品質が低下するため、「適期収穫チャート」を活用し、適期収穫に努める。</b>
	六条大麦 (カシマムギ)	乳熟期	2日早い		
	(カシマゴール)	乳熟期	平年並		
	二条大麦 (ミカモゴールデン)	乳熟期	平年並		
	11月20日播種 小麦 (さとのそら)	開花期～乳熟期	2日遅い		
	11月29日播種 裸麦 (キラリモチ)	乳熟期	-		
	※キラリモチは出芽不良のため11/29に再度播種を行ったため参考値。				




図1 半旬別最高・最低・平均気温の推移 (月・半旬)  
 注) 水戸地方気象台龍ヶ崎観測所アメダスデータより作成




図2 半旬別降水量の推移 (月・半旬)  
 注) 水戸地方気象台龍ヶ崎観測所アメダスデータより作成




図3 半旬別日照時間の推移 (月・半旬)  
 注) 水戸地方気象台龍ヶ崎観測所アメダスデータより作成

表1 輪換畑における麦類の出穂期(龍ヶ崎市、水田利用研究室)

播種期	麦種	品種名	出穂期			
			本年値 (月.日)	前年値 (月.日)	平年値 (月.日)	平年差
11.14	小麦	さとのそら	4.12	4.8	4.7	5
	六条大麦	カシマムギ	4.1	3.29	4.1	0
		カシマゴール	3.27	3.25	3.30	-3
	二条大麦	ミカモゴールデン	3.30	3.25	3.29	1
11.20	小麦	さとのそら	4.13	4.11	4.10	3
11.29	裸麦	キラリモチ	4.8	-	-	-

【耕種概要】

- 1) 圃場来歴：転換2年目（前作大豆）
- 2) 播種期：平年の播種期は11月10日、21日
- 3) 播種量：（小麦・六条）0.8kg/a、（二条）1.0kg/a
- 4) 播種様式：条間30cm、ドリル播き（シーダーテープによる）
- 5) 基肥：（小麦）N-P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-K<sub>2</sub>O=1.0-1.5-1.3kg/a、（六条・二条）N-P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-K<sub>2</sub>O=0.8-1.2-1.1kg/a
- 6) 麦踏み：2024年12月25日、2025年1月15日、1月30日（11/14播種）。2025年1月15日、1月30日、2月14日（11/20播種）。  
2025年1月30日、2月14日（キラリモチ）に実施。
- 7) 茎立期追肥：六条大麦は2025年3月3日、小麦は3月14日、裸麦は3月18日に施用。二条大麦は未施用。

【平年値】

2019年～2023年播種の5ヵ年の平均値、キラリモチは出芽不良により再度11/29に播種を行ったため参考値。

表2 生育予測モデル及び登熟積算気温により予測した成熟期


2025年4月28日現在

播種期 (月.日)	麦種	品種	予測成熟期					成熟期	
			低温 (月.日)	やや低温 (月.日)	平年並 (月.日)	やや高温 (月.日)	高温 (月.日)	平年値 (月.日)	平年差 (日)
11.14	小麦	さとのそら	6.9	6.4	5.30	5.27	5.24	5.27	3
	六条大麦	カシマムギ	5.13	5.12	5.11	5.11	5.10	5.13	-2
		カシマゴール	5.14	5.14	5.13	5.13	5.12	5.13	0
11.20	二条大麦	ミカモゴールド	5.12	5.11	5.11	5.10	5.9	5.11	0
11.29	小麦	さとのそら	6.9	6.4	5.31	5.27	5.24	5.29	2
	裸麦	キラリモチ	5.20	5.19	5.18	5.17	5.16	-	-

## 【注釈】

- 1) 小麦「さとのそら」、六条大麦「カシマゴール」はDVRモデルによる予測。実際の予測は、農業研究所ホームページ（下記URL）から表計算ソフトのファイルをダウンロードして行う。  
<https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/noken/seiikuyosoku/mugidvryosoku/mugidvryosoku.html>
- 2) 六条大麦「カシマムギ」、二条大麦「ミカモゴールド」、「キラリモチ」は、登熟積算気温と平均気温の平年値を用いた予測。
- 3) 予測成熟期の低温・やや低温・平年並・やや高温・高温は、予測日以降の平均気温が、それぞれ□ -2℃・-1℃・±0℃・+1℃・+2℃で推移した場合の予測値を示す。
- 4) 耕種概要と平年値は表1に準じる。
- 5) 平年差は、予測日以降の平均気温が平年並みに推移した場合の予測成熟期と平年値の差を示す。

11/14 播種 さとのそら




11/20 播種 さとのそら



写真1 所内小麦の生育状況(左 11月14日播種、右 11月20日播種 2025年4月28日撮影)

カシマムギ



カシマゴール



ミカモゴールド



キラリモチ



写真2 所内大麦の生育状況

(左上 カシマムギ、右上 カシマゴール、左下 ミカモゴールド 11月14日播種、右下 キラリモチ 11月29日播種、2025年4月28日撮影)

## 気象概況および生育状況における表現について

平年値(過去5年間の平均値)との違いの程度を、「低い(少ない)」、「平年並」、「高い(多い)」等の階級区分で表しています。  
 各階級の幅は、下図のように、統計期間における出現率が等分(それぞれ33%)となるように決めています。  
 さらに、「低い(少ない)」、「高い(多い)」については、補足的表現として下図に示す出現率となるように「やや」、「かなり」と表しています。

