

BLASTAM(ブラスタム)による葉いもち感染好適条件判定結果(令和7年)

7月1日現在、病害虫防除所の巡回調査において、葉いもちの発生は平年並です。
6月17日以降、葉いもち感染好適条件日(●)はほとんど認められていませんが、曇雨天であった6/24～6/27は県内の広域で準好適条件日(○)が確認され、好適条件日(●)が出現した地点もあります。曇雨天が続く場合は水田をよく観察し、本病の発生に注意してください。

6月		アメダス地点	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30
県北	北茨城	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	大子	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	●	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-
	日立	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
	常陸大宮	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-
県央	水戸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	笠間	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-
鹿行	鉾田	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
	鹿嶋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
県南	土浦	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
	龍ヶ崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
	つくば	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
県西	下館	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	?	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-
	下妻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	古河	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-

【●好適条件日の集計値】

6/1-6/30	
本年	平年
1	1.4
1	2.4
1	1.4
1	2.1
2	1.6
2	2.0
2	2.3
2	2.0
2	2.5
1	1.8
2	2.4
3	1.8
2	1.8
4	2.7

※平年:過去10年(H27～R06年)の平均値

●	好適条件	①葉面の湿潤時間が10時間以上 ②葉面の湿潤時間中の平均気温が15℃～25℃ ③前5日間の平均気温が20～25℃	①、②、③の条件が満たされると、 いもち病に感染するのに好適な条件 と判定される。
○	準好適条件	①、②、③のうち1つが満たされていない	
—	好適条件なし		
?	判定不能		

注)BLASTAMは、広域にいもち病が感染する時期を推定するシステムであり、
特定地点の発生を予測するものではなく、周辺地点の感染好適条件の出現
状況も併せて判断することが重要です。
最寄りのアメダス地点で感染好適条件が出現していなくても、圃場によっ
ては感染に好適な条件になっている場合があります。