

BLASTAM(ブラスタム)による葉いもち感染好適条件判定結果(令和8年)

本年の葉いもち好適条件判定結果の更新は、今回で終了となります。
7月のBLASTAMにおける感染好適日(●)の出現状況は平年並～やや少なく、病害虫防除所の調査地点における葉いもちの発生は平年並でした。
いもち病菌が穂に侵入しやすいのは、出穂直後から出穂後14日くらいまでです。この期間に降雨が続く場合は、穂いもちの発生に注意が必要です。
特に葉いもちが多発し、上位葉に病斑が進展している水田では防除を徹底しましょう。

6月

	アメダス地点	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	
県北	北茨城	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
	大子	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	○	-	●	-	-
	日立	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	常陸大宮	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	●	-	-
県央	水戸	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	●	-
	笠間	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	●	-	-
県南	鉾田	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	●	○	-	-	-	-	-	-	○	○	●	●	-
	鹿嶋	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
県南	土浦	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-
	龍ヶ崎	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	●	●	-	●	-	
	つくば	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-
県西	下館	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-
	下妻	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	
	古河	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-

【●好適条件日の集計値】

6/1-6/30	
本年	平年
0	1.3
2	2.3
1	1.3
1	2.1
1	1.6
2	2.2
3	2.3
1	1.8
2	2.6
3	1.6
2	2.6
2	2.0
1	2.0
2	3.1

※平年:過去10年(H28～R07年)の平均値

7月

	アメダス地点	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31
県北	北茨城	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	●	●	-
	大子	-	○	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	●	-	●
	日立	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	常陸大宮	-	○	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	●
県央	水戸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	笠間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-
県南	鉾田	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鹿嶋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○
県西	土浦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○
	龍ヶ崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	つくば	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	下館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
県西	下妻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	古河	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-

【●好適条件日の集計値】

7/1-7/31	
本年	平年
4	2.9
7	4.4
1	2.5
4	3.6
0	2.2
1	2.6
0	2.0
1	1.8
0	1.7
0	2.0
0	2.1
0	2.2
0	2.1
1	3.2

※平年:過去10年(H28～R07年)の平均値

●	好適条件	①葉面の湿潤時間が10時間以上 ②葉面の湿潤時間中の平均気温が15℃～25℃ ③前5日間の平均気温が20～25℃	①、②、③の条件が満たされると、 いもち病に感染するのに好適な条件と判定される。
○	準好適条件	①、②、③のうち1つが満たされていない	
—	好適条件なし		
?	判定不能		

注)BLASTAMは、広域にいもち病が感染する時期を推定するシステムであり、特定地点の発生を予測するものではなく、周辺地点の感染好適条件の出現状況も併せて判断することが重要です。
最寄りのアメダス地点で感染好適条件が出現していても、圃場によっては感染に好適な条件になっている場合もあります。