

BLASTAM(ブラスタム)による葉いもち感染好適条件判定結果(令和8年)

7月27日現在、病害虫防除所の巡回調査地点において、葉いもちの発生を確認しています。
いもち病菌が穂に侵入しやすいのは、出穂直後から出穂後14日くらいまでです。この期間に降雨が続く場合は、穂いもちの発生に注意が必要です。
特に葉いもちが多発し、上位葉に病斑が進展している水田では防除を徹底しましょう。

6月

アメダス地点	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30
県北	北茨城	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
	大子	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	○	-	●	-	-
	日立	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	常陸大宮	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	●	-	-
県央	水戸	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	●	-
	笠間	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-
鹿行	鉾田	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	●	○	-	-	-	-	-	-	○	○	●	●	-
	鹿嶋	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
県南	土浦	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-
	龍ヶ崎	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	●	●	-	●	-
	つくば	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-
県西	下館	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-
	下妻	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	古河	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-

※ 平成：過去10年(H28～R07年)の平均値

【●好適条件日の集計値】

6/1-6/30	
本年	平成
0	1.3
2	2.3
1	1.3
1	2.1
1	1.6
2	2.2
3	2.3
1	1.8
2	2.6
3	1.6
2	2.6
2	2.0
1	2.0
2	3.1

7月

アメダス地点	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31
県北	北茨城	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大子	-	○	●	●	-	-	●	-	-	-	●	-	●	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	日立	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	常陸大宮	-	○	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
県央	水戸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	笠間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-
鹿行	鉾田	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鹿嶋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
県南	土浦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	龍ヶ崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	つくば	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
県西	下館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
	下妻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	古河	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 平成：過去10年(H28～R07年)の平均値

【●好適条件日の集計値】

7/1-7/25	
本年	平成
2	2.5
5	3.6
1	2.1
3	3.1
0	1.9
1	2.1
0	2.4
1	1.4
0	1.4
0	1.2
0	1.7
0	1.6
0	1.8
1	2.7

●	好適条件	①葉面の湿潤時間が10時間以上 ②葉面の湿潤時間中の平均気温が15℃～25℃ ③前5日間の平均気温が20～25℃	①、②、③の条件が満たされると、 いもち病に感染するのに好適な条件と判定される。
○	準好適条件	①、②、③のうち1つが満たされていない	
－	好適条件なし		
？	判定不能		

注)BLASTAMIは、広域にいもち病が感染する時期を推定するシステムであり、
特定地点の発生を予測するものではなく、周辺地点の感染好適条件の出現
状況も併せて判断することが重要です。
最寄りのアメダス地点で感染好適条件が出現していなくても、圃場によっ
ては感染に好適な条件になっている場合もあります。