

令和7年
7月31日

病害虫発生予報 8月号

茨城県病害虫防除所

農薬散布の際は周囲への飛散防止対策を徹底しましょう
～令和7年度茨城県農薬危害防止運動期間（6/15～9/14）～

< 目次 >

I. 今月の予報

【注意すべき病害虫】

水稲：いもち病（穂いもち）	1
水稲：斑点米カメムシ類（イネカメムシ、クモヘリカメムシ、アカスジカスミカメ等）	1
サツマイモ：ナカジロシタバ	2
ナシ：ハダニ類	2
ナシ：ナシヒメシンクイ（第四世代幼虫）	3
【防除所レポート】ナシヒメシンクイの防除適期の予測	3
果樹共通：果樹カメムシ類 （チャバネアオカメムシ、クサギカメムシ、ツヤアオカメムシ）	4
夏秋ナス：ハダニ類	4
共通害虫：シロイチモジヨトウ、オオタバコガ	5

【その他の病害虫】

水稲、サツマイモ、ナシ、ブドウ、秋冬ネギ、夏秋ナス、共通害虫	6
--------------------------------	---

II. 今月の気象予報 7

最新の農薬登録内容は、農林水産省ホームページの「農薬登録情報提供システム」(<https://pesticide.maff.go.jp/>) で確認することができます。

詳しくは、茨城県病害虫防除所へお問い合わせ下さい。Tel :0299-45-8200
ホームページでは病害虫・フェロモントラップ・農薬関連情報がご覧いただけます。
<https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/nosose/byobo/boujosidou2/>



※病害虫の発生状況や、適切な防除方法は地域により異なる可能性があります。病害虫の防除や農薬についてのご相談は、お住まいの都道府県にある病害虫防除所等の指導機関にお問い合わせください。

I. 今月の予報

【注意すべき病害虫】

水 稲

1. いもち病（穂いもち）

[予報内容]

発生時期	発生量	発生地域
—	やや少ない	県下全域

[予報の根拠]

- ① 7月下旬現在、葉いもちの発病度¹⁾（本年値 1.0、平年値 2.7）、発生地点率（本年値 26%、平年値 45%）ともに平年よりやや少ない。
- ② 葉いもちの感染好適日出現日数（BLASTAM²⁾による）は、平年よりやや少ない。
 - 1) 発病度：株ごとの発病程度をもとに算出した数値、最小値は0で最大値は100となる。
 - 2) BLASTAM：アメダスデータを利用した葉いもちの発生予測プログラム。

[防除上注意すべき事項]

- ① いもち病菌がイネの穂に感染しやすいのは、出穂直後から出穂後 14 日位までである。この期間に降雨が続く場合は、発生に注意する。
- ② 穂いもちを対象とした液剤による防除適期は、穂ばらみ末期～穂揃期である。葉いもちが多発し、上位葉に病斑が進展している水田では、防除を徹底する。
- ③ 殺菌剤を複数回使用する場合、薬剤感受性の低下を防ぐため、FRAC コードの異なる薬剤を選択する。

2. 斑点米カメムシ類（イネカメムシ、クモヘリカメムシ、アカスジカスミカメ等）

[予報内容]

発生時期	発生量	発生地域
—	多い	県下全域

[予報の根拠]

- ① 7月下旬現在、水田内における斑点米カメムシ類の10回振りすくい取り虫数（本年値4.0頭、平年値1.0頭）は平年より多く、発生地点率（本年値44%、平年値27%）は平年よりやや高い～高い。
- ② 7月下旬現在、水田内におけるイネカメムシの10回振りすくい取り虫数（本年値2.4頭、平年値0.2頭）は平年より多く、発生地点率（本年値21%、平年値5%）は平年よりやや高い～高い。

[防除上注意すべき事項]

- ① 出穂期前後の圃場を観察し、成虫や幼虫を確認した場合は、不稔被害の軽減を目的とした防除を出穂期～穂揃期に行う。
- ② 乳熟期以降に斑点米カメムシ類の密度が高いと斑点米の発生量が多くなる。斑点米被害の軽減を目的とした防除は、乳熟期（出穂期10～15日後）に行う。防除を実施した水田であっても、その後に幼虫のふ化、成虫の再飛来が起こるため、発生を認めた場合は追加防除を実施する。ふ化直後の幼虫は非常に小さく、発生に気が付かない場合があるため、水田内をよく観察する。
- ③ 発生量が多い圃場では、出穂期と乳熟期の2回散布を実施する。
- ④ 本年は稲の出穂期が平年より早いと予想されるため、防除適期を逸しないよう注意する。

(水稲 続き)

- ⑤ 防除の際には、農薬の収穫前日数や使用回数及び周辺作物（特に早生品種を作付している水田）への飛散に注意する。
- ⑥ 晩生品種等、周辺水田と出穂期が異なる圃場では、集中的に被害を受けることがあるので特に注意する。
(令和7年7月10日発表 病害虫発生予察注意報第1号参照)

サツマイモ

1. ナカジロシタバ

[予報内容]

発生時期	発生量	発生地域
—	やや多い～多い	県下全域

[予報の根拠]

- ① 7月下旬現在、被害つる先率（本年値 41.6%、平年値 20.3%）、発生地点率（本年値 100%、平年値 72%）ともに平年よりやや高い。
- ② 7月下旬現在、100葉あたりの寄生虫数（本年値 1.0頭、平年値 0.8頭）は平年よりやや多い～多く、発生地点率（本年値 60%、平年値 22%）は平年よりやや高い～高い。

[防除上注意すべき事項]

- ① 老齢幼虫になると薬剤の防除効果が劣るので、若齢～中齢幼虫の時期（つる先や上位葉に丸く穴の開いた葉が散見される時期）の防除に努める。
- ② 薬剤散布の際は、幼虫が生息する葉裏までよくかかるよう丁寧に散布する。

ナシ

1. ハダニ類

[予報内容]

発生時期	発生量	発生地域
—	やや多い～多い	県下全域

[予報の根拠]

- ① 7月下旬現在、寄生葉率（本年値 3.4%、平年値 1.1%）、発生地点率（本年値 40%、平年値 25%）ともに平年よりやや高い。
- ② 気象予報によると、向こう1か月の気温は平年より高いと予想され、発生を助長する条件である。

[防除上注意すべき事項]

- ① ハダニ類は増殖が速いので、発生の少ないうちに防除を徹底する。
- ② 薬剤は、10a当たり300リットルを目安に丁寧に散布する。圃場の周縁部等、薬液のかかりにくい部分に対しては、手散布等により補正散布を行う。また、薬剤抵抗性の発達を抑えるため、IRACコードの異なる薬剤をローテーション散布する。
- ③ 薬剤防除の際は、収穫前日数等に十分注意する。

(ナシ 続き)

2. ナシヒメシンクイ (第四世代幼虫)

[予報内容]

発生時期	発生量	発生地域
—	やや多い	県下全域

[予報の根拠]

- ① 7月下旬現在、一部圃場で果実の被害を認めている。
- ② 直近1か月間(6月21日～7月20日)のフェロモントラップへの誘殺数は、土浦市で平年よりやや多い～多く、小美玉市、土浦市、筑西市で平年よりやや多く、笠間市で平年並、かすみがうら市で平年よりやや少ない～少ない。

[防除上注意すべき事項]

- ① 被害果を見つけた場合は、速やかに処分し、成虫の発生を防ぐ。
- ② 早生品種(「幸水」等)で被害が認められた場合は、中生～晩生品種(「豊水」や「新高」等)で被害が多くなる傾向があるので注意する。
- ③ 薬剤は、10a当たり300リットルを目安に丁寧に散布する。圃場の周縁部等、薬液のかかりにくい部分に対しては、手散布等により補正散布を行う。
- ④ 薬剤防除の際は、収穫前日数等に十分注意する。
- ⑤ 薬剤散布の時期については、下記の防除所レポートを参考にする。

防除所レポート [ナシヒメシンクイの防除適期の予測]

- ① ナシヒメシンクイ第四世代幼虫を対象とした防除適期は、**第三世代成虫の誘殺数がピークに達した日の1～2日後**である。
- ② 各地点の第三世代成虫の誘殺最盛期は、第二世代成虫のフェロモントラップへの誘殺最盛期と有効積算温度から予測した。
- ③ 表中の土浦市、かすみがうら市、筑西市(下館地区)については、今後、病虫害防除所ホームページで誘殺状況を随時更新するので参考にする。
※薬剤散布の際には、収穫前日数等に十分注意する。

表 調査圃場におけるナシヒメシンクイ第四世代幼虫の予測防除適期

地点	第四世代幼虫の予測防除適期 ¹⁾		
笠間市	8月10日	～	8月14日
小美玉市	8月9日	～	8月13日
かすみがうら市	8月9日	～	8月13日
土浦市	8月5日	～	8月9日
筑西市(下館地区)	8月5日	～	8月9日
筑西市(関城地区)	8月5日	～	8月9日

1) 第二世代成虫の誘殺最盛期を基に予測した(7月28日現在)。

果樹共通

1. 果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ、クサギカメムシ、ツヤアオカメムシ）

[予報内容]

発生時期	発生量	発生地域
—	やや少ない	県下全域

[予報の根拠]

- ① 直近1か月間(6月21日～7月20日)のかすみがうら市の果樹園内に設置した予察灯への誘殺数(本年値46頭、平年値306頭)は平年よりやや少ない。
- ② 直近1か月間(6月21日～7月20日)の笠間市の果樹園内に設置した予察灯への誘殺数(本年値116頭、平年値3,604頭)は平年よりやや少ない～少ない。

[防除上注意すべき事項]

- ① カメムシ類は夜温が高くなると活動が活発になり、果樹園に飛来する。果樹園内でカメムシ類を確認した場合は、活動の鈍い早朝に薬剤防除を行う。
- ② カメムシ類の発生時期や発生量は地域や圃場によって異なるため、定期的に圃場全体を観察し、早期発見と薬剤による初期防除を徹底する。
- ③ 薬剤防除の際には、収穫前日数等に十分注意する。
- ④ 今後、果実が肥大するカキやリンゴの圃場では、カメムシ類が飛来するおそれがあるので注意する。

夏秋ナス

1. ハダニ類

[予報内容]

発生時期	発生量	発生地域
—	多い	県北地域

[予報の根拠]

- ① 7月下旬現在、被害葉率(本年値34.0%、平年値7.1%)は平年より高く、発生地点率(本年値67%、平年値42%)は平年並～やや高い。
- ② 気象予報によると、向こう1か月の気温は平年より高いと予想され、発生を助長する条件である。

[防除上注意すべき事項]

- ① ハダニ類は増殖が速いので、発生の少ないうちに防除を徹底する。
- ② 薬剤散布は、薬液が葉裏や葉柄にもよくかかるよう十分な量で丁寧に行う。また、気門封鎖剤以外については、薬剤抵抗性の発達を抑えるため、IRACコードの異なる薬剤をローテーション散布する。
- ③ 薬剤防除の際には、収穫前日数等に十分注意する。

共通害虫

1. シロイチモジヨトウ

[予報内容]

発生時期	発生量	発生地域
—	やや多い～多い	県下全域

[予報の根拠]

- ① 直近1か月間(6月26日～7月25日)のフェロモントラップ誘殺数は、笠間市で平年より多く、つくば市で平年よりやや多い～多い。

[防除上注意すべき事項]

- ① 中齢以降になると薬剤の防除効果が劣るので、圃場をよく観察し、集団で生息する若齢幼虫の早期発見に努める。
- ② 幼虫が作物内に食入するとその後の防除が困難になるため、早期発見に努め、防除を徹底する。
- ③ 施設栽培ではハウスの開口部に防虫ネットを設置し、成虫の侵入防止に努める。
- ④ 薬剤散布は、薬液が葉裏や株元にもよくかかるよう十分な量で丁寧に行う。また、複数回散布する場合は、薬剤抵抗性の発達を抑えるため、IRACコードの異なる薬剤をローテーション散布する。
- ⑤ 令和4年度に主要薬剤の殺虫効果について試験を行ったので参考にする。

(令和5年2月24日発表 病害虫発生予報3月号 p3-4 防除所レポート参照)

2. オオタバコガ

[予報内容]

発生時期	発生量	発生地域
—	やや多い	県下全域

[予報の根拠]

- ① 直近1か月間(6月21日～7月20日)のフェロモントラップ誘殺数は、筑西市および龍ヶ崎市で平年より多く、坂東市で平年よりやや多く、土浦市で平年並～やや多い。
- ② 7月下旬現在、大豆、ナスの圃場で発生を認めている。

[防除上注意すべき事項]

- ① 中齢以降になると薬剤の防除効果が劣るので、圃場をよく観察し、若齢幼虫のうちに防除を行う。
- ② 幼虫が作物内に食入するとその後の防除が困難になるため、若齢幼虫の防除を徹底する。結球葉菜類では、結球始期前後の防除を徹底する。
- ③ 施設栽培ではハウスの開口部に防虫ネットを設置し、成虫の侵入防止に努める。
- ④ 薬剤散布は、薬液が葉裏や株元までよくかかるよう十分な量で丁寧に行う。また、複数回散布する場合は、薬剤抵抗性の発達を抑えるため、IRACコードの異なる薬剤をローテーション散布する。
- ⑤ 病害虫防除所ホームページに、フェロモントラップの誘殺状況を公開しているので参考にする。

【その他の病害虫】

作物	病害虫名	発生予測	発生概況及び注意すべき事項
水稲	紋枯病	発生量：平年並 ～やや多い	7月下旬現在、平年並の発生である。向こう1か月の気温は高いと予想され、発生を助長する条件である。
	ニカメイガ	発生量：やや多い	7月下旬現在、平年よりやや多い発生である。
	イネツトムシ	発生量：やや少ない	7月下旬現在、平年よりやや少ない発生である。葉色が濃い水田では発生に注意し、発生が多い場合には、幼虫が小さいうち（葉先が巻かれ始める時期）に防除を実施する。
イモ サツマ	イモキバガ	発生量：平年並 ～やや多い	7月下旬現在、平年並～やや多い発生である。
ナシ	黒星病	発生量：やや少ない	7月下旬現在、平年よりやや少ない発生である。
	アブラムシ類	発生量：やや多い	7月下旬現在、平年よりやや多い発生である。
ブドウ	褐斑病	発生量：やや多い	7月下旬現在、平年並よりやや多い発生である。
	晩腐病		
	べと病	発生量：平年並	7月下旬現在、平年並の発生である。
	ハダニ類	発生量：平年並 ～やや多い	7月下旬現在、平年並～やや多い発生である。
秋冬ネギ	ネギアザミウマ	発生量：－	7月下旬現在、夏ネギ圃場において平年並～やや多い発生である。（秋冬ネギでも注意する。）
夏秋ナス	チャノホコリダニ	発生量：多い	7月下旬現在、発病果率は平年より多い発生である。発生が多くなると防除が困難になるため、初期防除を徹底する。
	アザミウマ類	発生量：やや多い ～多い	7月下旬現在、平年よりやや多い～多い発生である。
	アブラムシ類		
共通害虫	ハスモンヨトウ	発生量：平年並 ～やや多い	7月下旬現在、直近1か月間のフェロモントラップへの誘殺数は、笠間市で平年より多く、龍ヶ崎市および銚田市で平年よりやや多く、筑西市で平年並、土浦市で平年よりやや少ない発生である。

II. 今月の気象予報

関東甲信地方1か月予報

(予報期間 8月2日から9月1日)

気象庁(7月31日 発表)

<向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)>

[確率]

要素	予報対象地域	低い(少ない)	平年並	高い(多い)
気温	関東甲信全域	10	20	70
降水量	関東甲信全域	30	30	40
日照時間	関東甲信全域	30	30	40

[概要]

平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

期間のはじめは、気温がかなり高くなる見込みです。

<1週目の予報> 8月2日(土曜日)から8月8日(金曜日)

気温 関東甲信地方 高い確率80%

<2週目の予報> 8月9日(土曜日)から8月15日(金曜日)

気温 関東甲信地方 高い確率50%

<3週目から4週目の予報> 8月16日(土曜日)から8月29日(金曜日)

気温 関東甲信地方 高い確率60%

農薬を使用する際は

- 1 使用する農薬の「ラベル」と登録変更に関する「チラシ」等を必ず確認し、適用作物、使用方法、注意事項等を守りましょう。
- 2 散布時には、周辺作物に飛散(ドリフト)しないよう注意しましょう。
- 3 農薬の使用状況を正確に記録しましょう。
- 4 薬剤抵抗性の発達を抑えるため、作用機構分類(FRACコード、IRACコード)の異なる薬剤を用いてローテーション散布しましょう。
- 5 農薬の使用後は、散布器具やホース内等に薬液が残らないように良く洗浄しましょう。