

漁海況速報

8-No. 19

茨城県水産試験場
漁業無線局

令和8年 7月31日～ 8月 6日

電話 (029) 273-7911

FAX (029) 270-1480

<http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/nourinsuisan/suishi/index.html>

【海況図説明】

- 黒潮は、犬吠埼の南南東20マイル付近を東北東に流れ、
36°10'N 142°30'E付近を流去している。
- 本県沿岸域は、21～23℃台の水温となっている。



那珂湊定地水温(℃)

日	年 令 8	令 7	平年
7/31	21.5	20.8	21.1
8/1	22.1	21.2	21.2
2	欠測	21.8	21.3
3	22.4	21.9	21.3
4	22.3	22.2	21.4
5	23.0	22.4	21.5
6	22.9	22.8	21.6
平均	22.4	21.9	21.3


30年平均: 1991～2020年

令和8年 7月31日～ 8月 6日

【1週間合成衛星画像】



【海況図】



令和7年 8月 1日～ 8月 7日

【海況図】

漁 況 の 特 徴

8 - No. 1 9

属地、単位＝四捨五入

7/30～8/5

◎

まき網

(漁獲は1投網当り)

マイワシ・・・八戸の北20マイル付近で
1～15トンの漁獲。

サバ・・・八戸の東20マイル付近で
1～5トンの漁獲。

イカ・・・八戸の東20マイル付近で
1～10トンの漁獲。

◎

小型船

(漁獲は1隻当り)

◇船曳網

シラス・・・大津地先から日立地先で12～
1,040kg、大洗地先から波
崎地先で78～1,357kgの
漁獲。

カエリ・・・大津地先から磯原地先で10～
800kgの漁獲。

◇曳釣り

平潟地先でヒラメ10～15kg、那珂湊地
先から大洗地先でヒラメ1～2kg、イナダ5
～10kg、サワラ2～10kgの漁獲。

◇建網

鹿島地先でヒラメ、イセエビ混じり7～
104kgの漁獲。

魚 種	漁 法	組合名	水揚量 kg	平均単価	水揚金額 円	延隻数
シラス	船曳網	大 津	2,693	299	804,600	14
	"	久慈浜丸小	2,015	205	412,833	4
	"	久 慈 町	2,818	190	534,709	4
	"	那 珂 湊	406	264	107,250	
	"	大 洗 町	30,490	382	11,649,990	44
	"	は さ き	26,049	584	15,222,996	34
ヒラメ	固定式刺網	大 津	38	765	29,140	
	"	会 瀬	5	882	4,232	
	"	久慈浜丸小	148	857	126,950	
	"	那 珂 湊	48	1,210	57,588	
	"	大 洗 町	138	1,619	222,889	
	その他釣り	平 潟	200	1,719	344,186	
	"	久 慈 町	3	564	1,410	
	"	那 珂 湊	82	1,261	102,925	
	"	は さ き	2	1,500	3,000	
	大型定置網	会 瀬	66	833	54,612	
タイ類	固定式刺網	久慈浜丸小	6	300	1,650	
	"	那 珂 湊	1	500	700	
	"	大 洗 町	107	738	78,590	
	その他釣り	平 潟	6	796	4,538	
	"	久慈浜丸小	2	400	920	
	大型定置網	会 瀬	961	639	614,089	
スズキ	固定式刺網	大 洗 町	2	1,200	2,160	
	その他釣り	"	41	3,243	133,300	
	"	は さ き	54	1,063	56,870	
ホウボウ	その他釣り	那 珂 湊	1	1,700	1,700	
フグ類	大型定置網	会 瀬	2	350	525	
サワラ	その他釣り	平 潟	35	1,423	50,224	
	"	那 珂 湊	25	1,837	46,660	
イセエビ	固定式刺網	平 潟	5	5,160	26,316	
	"	大 津	810	4,544	3,680,448	
	"	川 尻	1,095	3,740	4,096,720	
	"	会 瀬	119	4,290	510,500	
	"	久慈浜丸小	320	4,751	1,518,750	
	"	久 慈 町	43	4,894	207,999	
	"	那 珂 湊	113	3,832	432,660	
	"	大 洗 町	175	5,007	876,700	
	"	は さ き	11	5,000	56,500	
マアジ	固定式刺網	那 珂 湊	3	1,000	3,000	
	"	大 洗 町	13	833	10,665	
	その他釣り	那 珂 湊	1	731	950	
	大型定置網	会 瀬	822	308	252,900	
サバ	その他釣り	那 珂 湊	2	600	1,380	
	大型定置網	会 瀬	977	217	212,465	
ブリ類	固定式刺網	久慈浜丸小	1	200	200	
	"	大 洗 町	12	400	4,640	
	その他釣り	久 慈 町	6	145	840	
	"	那 珂 湊	9	705	6,200	
	大型定置網	会 瀬	349	387	135,110	

注 延隻数:銘柄別隻数

茨城県水産試験場漁業無線局

水 産 の 窓

長期漁海況予報（令和8年8月～12月の予測）について

令和8年7月29日～30日に令和8年度第1回太平洋いわし類・マアジ・さば類長期漁海況予報会議が開催されました。予報対象海域に関係する水産関係試験研究機関が参加・検討し、国立研究開発法人水産研究・教育機構がとりまとめ、予報文が8月3日に公表されましたのでお知らせします。内容の詳細については本文を参照ください。（水産機構 HP: https://www.fra.go.jp/home/kenkyushokai/press/pr2026/fri_20260803_ukiuo-pac-1st.html）

1. 海況

(1) 黒潮（潮岬以東）

- ・N型基調で推移するが、9月までは一時的にB型またはC型となる。
- ・遠州灘沖では、接岸傾向で推移する。
- ・9月までは一時的に八丈島の南側を通過する。
- ・房総沖では、擾乱（じょうらん）の東進に伴い一時的に離岸する。

(2) 鹿島灘～常磐南部海域

- ・9月までは冷水域に覆われやすいが、その後は断続的に黒潮系暖水の影響がみられる。

(3) 沿岸水温

- ・房総海域～常磐南部海域は、「やや低め」～「高め」で推移する。




図 予報対象海域および黒潮の流型

2. 漁況

(1) マサバ・ゴマサバ（犬吠埼沖～三陸海域、道東海域：まき網、定置網、底曳網）

- ① 来遊量：マサバはまき網では前年並～下回り、定置網、底曳網では前年を下回る。ゴマサバは混獲される程度。サバ類全体としては低水準。
- ② 漁期・漁場：定置網では期を通じて、底曳網では9月以降に漁獲される。まき網漁場は、8月～10月は道東～三陸南部海域、11月、12月は三陸北部海域～犬吠埼沖に主に形成される。
- ③ 魚体〔尾叉長〕：マサバは20cm～33cm（1歳魚、2歳魚、体重75g～400g）主体に、27cm～28cm（1歳魚、200g～230g）も漁獲される。

(2) マイワシ（房総～三陸海域、道東海域：まき網、定置網）

- ① 来遊量：前年を大きく下回る。
- ② 漁期・漁場：まき網は8月当初は三陸北部海域が主漁場となる。その後、10月まで房総～道東海域は小規模な漁場形成となる。11月、12月は三陸～常磐海域において漁場が形成される。定置網は、各地で期を通じて散発的に漁獲され、12月以降に本格化する。
- ③ 魚体〔被鱗体長〕：14cm以下の0歳魚（体重～30g）、13cm～16cm前後の1歳魚（25g～45g）、15cm～18cm前後の2歳魚（35～65g）、16cm～20cm前後の3歳魚（45g～90g）、17cm以上の4歳以上（55g以上）が漁獲される。

(3) カタクチイワシ（房総～三陸海域、道東海域：まき網、定置網）

- ① 来遊量：房総海域～三陸南部海域および道東海域では前年を上回る。三陸北部海域では前年並。
- ② 漁期・漁場：房総海域ではまき網（主に2そうまき網）、仙台湾～三陸南部海域では定置網により期を通じて漁獲される。三陸北部海域（八戸沖）では2そうまきにより9月以降に漁獲される。房総～常磐海域および道東海域では1そうまきの漁獲対象となる可能性がある。
- ③ 魚体〔被鱗体長〕：5cm～11cm前後の0歳魚（1g～13g）、9cm～13cm主体の1歳魚（7g～22g）が主に漁獲され、11～14cmの2歳魚（13g～27g）が混ざる。（回遊性資源部）

水産の窓

9月の水温は表層では平年並、深層ではやや低め～平年並

(令和8年8月の海況と今後の予測)

8 - N o . 1 2

令和8年8月7日

茨城県水産試験場

< 現 況 >

1 本県周辺海域の現況

- 黒潮続流は犬吠埼沖およそ70マイルを北東に流れています。表層では気温の上昇等に伴い水温が上昇しましたが、深層では冷水の影響が継続し沖側の広範囲で水温が低下しました。一方、岸付近では比較的暖かい潮が北から流入し、深層でも水温の上昇がみられました(図1)。

2 海洋観測結果(7/30～8/1:調査船「いばらき丸」)

- 水深別水温、前月差、平年差を図2、3、4に、鉛直水温を図5に示しました。
- 前月との水温比較(図3)

0m深 : 気温の上昇に伴い昇温傾向

50m以深: 冷水の影響で会瀬～鹿島沖141° 15' E以東で概ね降温傾向

岸付近で比較的暖かい潮が流入したことで141° E付近で概ね昇温傾向

- 平年との水温比較(図4)

0m深 : 「平年並～やや高め」

50m以深: 冷水の影響を受ける海域で「低め～やや低め」、黒潮続流が流れる海域で「やや高め」、岸付近で「平年並」

【参考】8月の0m深の平年値(142° E以西の30年間(1991-2020)の平均水温)

(定線別平年値※) 会瀬: 21～24℃台、大洗: 21～25℃台、鹿島: 22～26℃台、犬吠埼: 23～27℃台

詳しい情報は茨城県水産試験場ホームページをご覧ください。





図1. 海況の現況(8月1日)

21～28℃台

10～23℃台

7～19℃台

3～16℃台




図2. 水深別水温




図3. 水深別水温前月差




図4. 水深別水温平年差




図5. 鉛直水温

< 予 測 >

1か月後の海況(0m深)を予測し、図6、7に示しました。

今後1か月(9月上旬まで)の見通し

- 表層では気温の上昇等に伴い水温が上昇する
- 深層の冷水の影響は徐々に弱まるものの、継続する
- 1か月後の海況
- 0m深 : 平年並
- 50m以深: 冷水の影響を受けやや低め～平年並(黒潮続流が流れる沖合ではやや高め～高め)




図6. 0m深水温予測図




図7. 0m深平年偏差予測図

底水温の観測結果

141° E

142° E





図. 令和8年8月の底水温(*海底直上約5~20m)



*底水温表示のイメージ図

- 海洋観測で得られた最下層の水温データ(左図参照)をもとに底水温図を作成しました。
- 水深100 m以浅の底水温は12~20°C台でした。詳細は下表を参照ください。

茨城県水産試験場 海洋観測結果(2026年8月)

調査船: いばらき丸 調査海域: A=会瀬定線(県北部海域), O=大洗(県中北部海域)定線, K=鹿島定線(県中南部海域), I=犬吠埼定線(県南部海域)

観測点番号	A-1	A-2	A-3	A-5	O-1	O-2	O-3	O-4	O-5	K-1	K-2	I-1	I-2
月日	8/1	8/1	8/1	8/1	7/30	7/30	7/30	7/30	7/30	7/31	7/31	7/31	7/31
緯度	36° 34'	36° 34'	36° 34'	36° 34'	36° 19'	36° 19'	36° 19'	36° 19'	36° 19'	36° 00'	36° 00'	35° 42'	35° 42'
経度	140° 46'	140° 52'	140° 58'	141° 11'	140° 38'	140° 41'	140° 47'	140° 53'	140° 59'	140° 45'	141° 00'	141° 00'	141° 15'
開始時刻	4:15	3:45	3:05	1:40	13:57	14:20	14:56	15:40	16:17	6:09	4:40	9:32	10:42
終了時刻	4:27	3:51	3:18	2:02	14:00	14:25	15:08	15:46	16:38	6:18	5:02	9:44	11:05
水深	59m	101m	132m	520m	22m	31m	80m	173m	497m	29m	241m	75m	229m
流向(10m)	143	178	195	209	41	86	183	137	203	269	144	85	40
流速(10m)	0.6	0.8	1.3	0.7	0.2	1.5	0.1	0.3	0.4	0.7	0.7	0.1	1.3
流向(50m)	267	184	192	219			107	152	231		147	32	29
流速(50m)	0.3	0.6	1.0	0.9			0.5	0.1	0.2		0.6	0.3	0.8
流向(100m)			161	220				176	270		143		50
流速(100m)			0.5	0.6				0.1	0.3		0.8		0.5
水温 0m	22.8	23.3	20.6	23.8	21.3	22.3	22.9	21.0	21.7	24.0	22.4	22.1	27.2
10m	20.7	19.7	18.8	23.0	20.7	20.7	20.0	19.2	18.7	19.4	21.5	19.5	26.8
20m	18.8	17.4	16.6	16.8		19.0	17.9	16.2	16.0	17.8	18.3	16.2	21.4
30m	16.2	16.4	15.6	13.4			16.4	15.2	14.6		14.9	15.7	19.3
50m	14.7	15.4	14.7	12.1			13.3	14.1	13.5		14.0	14.6	14.9
75m		14.1	13.7	10.7				13.7	13.4		12.9		14.3
100m			11.5	9.7				13.1	12.6		11.9		13.4
125m				9.2				12.3	11.9		11.1		12.6
150m				8.5				11.6	10.3		8.9		12.0
175m				6.5					8.3		6.8		11.1
200m				6.4					7.5				9.7
250m				4.7					5.6				
300m				3.8					4.4				
400m				3.6					3.8				
500m				3.8									
観測最下層水深(m)	52	92	122	502	17	26	70	165	478	26	187	67	222
観測最下層水温(°C)	14.6	12.7	10.7	3.8	20.4	17.4	13.0	10.2	4.0	17.3	6.4	14.0	7.8

備考

- ・流向流速値は補正前の数値のため、誤差を含んでいます。
- ・流向は海流・潮流が流れて行く方向を示しています。(例 0° = 真潮, 180° = 逆潮)