

漁 海 況 速 報

7-No. 44

茨城県水産試験場
漁業無線局

令和8年 1月30日～ 2月 5日

電話 (029) 273-7911
FAX (029) 270-1480

<http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/nourinsuisan/suishi/index.html>


那珂湊定地水温 (℃)

日	年 8	年 7	平年
1/30	11.2	12.7	10.5
31	11.0	12.2	10.5
2/1	11.5	11.8	10.4
2	11.6	11.8	10.4
3	11.5	13.4	10.4
4	11.8	13.8	10.3
5	12.3	13.4	10.3
平均	11.6	12.7	10.4

30年平均: 1991～2020年

令和8年 1月30日～ 2月 5日

【1週間合成衛星画像】



漁況の特徴

7 - No. 4 4

属地、単位=四捨五入

1/29~2/4

魚種	漁法	組合名	水揚量 kg	平均単価	水揚金額 円	延隻数	
ヒラメ	小底5t以上	大津尻	4	1,900	8,170		
	"	川尻	2	600	1,440		
	"	久慈町	304	1,462	444,070		
	"	那珂湊	181	1,598	289,895		
	その他釣り	平潟	39	2,019	78,344		
	"	大津尻	52	1,363	70,860		
	"	川尻	31	1,560	48,990		
	"	久慈町	16	1,346	21,540		
	"	那珂湊	134	1,847	247,500		
	大型定置網	会瀬	33	1,535	51,126		
タイ類	小底5t以上	那珂湊	99	1,154	113,744		
	その他釣り	"	8	1,897	14,610		
	大型定置網	会瀬	27	862	23,455		
スズキ	小底5t以上	那珂湊	10	1,337	13,640		
	その他釣り	"	6	584	3,330		
	大型定置網	会瀬	671	299	200,460		
アナゴ	小底5t以上	久慈町	29	492	14,030		
	"	那珂湊	15	1,166	17,030		
アンコウ	小底5t以上	平潟	17	957	16,462		
	"	大津尻	87	835	72,550		
	"	川尻	25	374	9,420		
	"	久慈町	447	284	127,100		
	"	那珂湊	216	679	146,750		
	大型定置網	会瀬	2	350	700		
タラ類	大型定置網	会瀬	7	806	5,400		
	ホウボウ	小底5t以上	久慈町	7	488	3,560	
フグ類	"	那珂湊	259	643	166,672		
	小底5t以上	久慈町	4	1,000	3,800		
	その他釣り	平潟	11	3,033	33,972		
	"	久慈町	5	1,188	5,700		
大型定置網	会瀬	14	750	10,570			
	サワラ	その他釣り	久慈町	8	2,000	16,400	
	"	那珂湊	10	2,391	24,630		
スルメイカ	小底5t以上	平潟	735	973	714,800		
	"	大津尻	(76)	8,881	(山壳) 674,930		
	"	川尻	841	819	688,100		
	"	久慈町	1,337	689	920,500		
	"	那珂湊	1,211	1,045	1,266,510		
ヤリイカ	小底5t以上	平潟	972	818	794,700		
	"	大津尻	(254)	10,874	(山壳) 2,764,101		
	"	川尻	1,802	980	1,764,750		
	"	久慈町	5,935	951	5,644,775		
	"	那珂湊	311	1,374	426,670		
マダコ	小底5t以上	久慈町	14	1,354	18,960		
	"	那珂湊	4	2,000	7,800		
	その他釣り	"	2	2,500	5,500		
	タコ壺	はさき	176	1,515	265,950		
マアジ	小底5t以上	平潟	60	227	13,600		
	"	大津尻	76	499	37,930		
	"	川尻	115	200	22,960		
	"	久慈町	112	307	34,195		
	"	那珂湊	19	866	16,020		
	大型定置網	会瀬	584	483	281,990		
サバ	小底5t以上	平潟	130	28	3,606		
	"	大津尻	7	500	3,650		
	"	久慈町	2	100	200		
	"	那珂湊	3	400	1,120		
	大型定置網	会瀬	382	337	128,710		
ブリ類	大型定置網	那珂湊	29	3,436	100,000		
	その他漁業	"	3	1,300	4,420		
	その他釣り	"	69	1,062	72,820		
	大型定置網	会瀬	86	407	35,060		

注 延隻数:銘柄別隻数 大津の水揚の一部は水揚げ量・平均円共に「山壳」を含む

茨城県水産試験場漁業無線局

◎ まき網

(漁獲は1投網当り)

マイワシ・・・鹿島の北東10マイル付近から犬吠埼の南東10マイル付近で1~72トンの漁獲。

カタクチイワシ・鹿島の東北東10マイル付近から鹿島の東南東10マイル付近で2~4トンの漁獲。

サバ・・・鹿島の北東10マイル付近から犬吠埼の北東10マイル付近で1~30トンの漁獲。

ウルメイワシ・鹿島の東北東10マイル付近で1~2トン、犬吠埼の東南東10マイル付近で2~25トンの漁獲。

◎ 小型船

(漁獲は1隻当り)



◇曳釣り

平潟地先でヒラメ3~5kg、久慈浜地先から鉢田地先でヒラメ1~40kg、ホウボウ1~3kg、イナダ1~5kg、マゴチ1kg前後、アイナメ1kg前後、スズキ2~3kgの漁獲。

◇タコツボ



鹿島地先でマダコ25~170kg、波崎地先でマダコ64~111kgの漁獲。

☆鹿島灘~犬吠埼沖でマイワシ、サバ類等を漁獲(まき網)
1日夜は鹿島灘から犬吠埼沖でまき網の漁場が形成され、1,807トンの漁獲となりました。2日に鏡子に水揚げされたマイワシのサイズは、体長12.9~20.1cm、モードは17cm台、体重は17~80g、モードは50g台、脂肪は2~7%でした。



☆サバ類

測定したサバ類はマサバ主体で、サイズは尾叉長17~24cm、モード19~21cm、体重50~140g、50g主体、脂肪は2~7%でした。



底魚資源調査（冬季）を実施しました

水産試験場では、本県沖の主要な底魚類の資源動向を把握するため、H15年から調査船いばらき丸(218t)により年2回（夏季、冬季）の着底トロール調査（オッタートロール）を実施しています。本調査では、本県沖の水深75～450mまでの海域、合計29定点において、15～30分間（速力3～4ノット）網を曳き、面積密度法により本県海域の現存量を推定しています。今回はR7年11月に実施した冬季調査結果についてお知らせします。なお、今回は調査船ドックの都合により、例年よりも早い11月に調査を実施しました（例年は12～1月に実施）。

1 主要な底魚類の推定現存量の推移

H28年度から今年度までの推定現存量の推移を下表に示しました。資源水準については過去20年の調査で推定された現存量と比較して、今回の現存量が上位75%以上であれば高位、25%以上75%未満を中位、25%未満を低位としました。ヒラメ、マコガレイ、ムシガレイについては浅海域における現存量を正確に評価できないため、「茨城県産重要魚類の生態と資源」（令和7年3月更新、水試ホームページ）で報告している資源水準としました。

漁獲対象種の増減傾向を直近5年間の推移から判定した結果、増加傾向にあるのはアオメエソ（めひかり）、ユメカサゴ（のどぐろ）の3種、横ばい傾向にあるのはマガレイ（沖まこ）、ミギガレイ（にくもち）、ヤナギダコの3種、減少傾向にあるのはヒラメ、ヤナギムシガレイ、ババガレイ（なめた）、アカガレイ（赤がれい）、マコガレイ（本まこ）、ムシガレイ、エゾイソアイナメ（どんこ）、マダラ、アカムツ、キチジ（あかじ）、マアナゴ、マトウダイの12種でした。その他、漁獲対象とはなっていないトラザメ（ねこざめ）は横ばい傾向、テナガダラ（とうじん）は減少傾向でした。

表 現存量の推移(冬季トロール調査)

(単位:トン)

魚種/年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	傾向	水準	過去10年平均		
漁 獲 対 象 種	ヒラメ	310	261	221	247	181	156	253	125	2	11	減少	中位	177	
	ヤナギムシガレイ	46	37	52	57	32	65	61	75	40	31	減少	低位	50	
	ババガレイ（なめた）	25	32	39	10	20	16	38	54	4	8	減少	低位	25	
	アカガレイ（赤がれい）	94	66	73	51	85	25	9	3	0	0	減少	低位	41	
	マコガレイ（本まこ）	46	26	25	31	3	6	6	7	3	0	減少	低位	15	
	マガレイ（沖まこ）	13	5	6	8	0	0	0	0	0	0	横ばい	低位	3	
	ムシガレイ	248	187	416	324	327	406	409	391	103	244	減少	中位	305	
	ミギガレイ（にくもち）	26	56	24	52	41	17	48	64	28	34	横ばい	中位	39	
	ヤナギダコ（水だこ）	105	122	104	74	102	88	54	99	102	42	横ばい	低位	89	
	アオメエソ（めひかり）	14	173	30	28	7	370	57	77	101	504	増加	高位	136	
	エゾイソアイナメ（どんこ）	577	347	401	223	1,033	402	188	361	164	171	減少	中位	387	
	マダラ	156	68	63	22	7	7	6	9	5	0	減少	低位	34	
	アカムツ	1	3	2	3	1	36	14	15	3	12	減少	中位	9	
	ユメカサゴ（のどぐろ）	11	32	17	45	11	20	23	59	34	49	増加	高位	30	
	キチジ（あかじ）	117	102	71	119	72	38	27	26	14	6	減少	低位	59	
	マアナゴ	36	80	60	59	42	145	20	35	24	19	減少	低位	52	
	マトウダイ	17	20	86	76	47	30	38	35	19	17	減少	低位	38	
	参考	トラザメ（ねこざめ）	3,271	1,843	3,183	2,697	3,465	1,697	6,230	2,623	207	4,342	横ばい	高位	2,999
		テナガダラ（とうじん）	1,154	3,046	3,588	1,582	2,727	2,190	2,340	213	637	231	減少	低位	1,852
		スルメイカ	5	4	6	23	19	12	2	9	22	31			13

2 今年度と昨年度調査結果の比較

昨年度と比較して、増加傾向の魚種数は増えましたが（1種→2種）、減少傾向の魚種数も増加しました（8種→12種）。今年度は減少を示す魚種が多くなり、底魚類の資源状況には注視が必要です。また、スルメイカの推定現存量を参考に示しましたが、底曳網漁業の漁模様と同じく増加傾向でした。しかし、現在の調査では現存量を過小に評価してしまうことから、今後は現存量を正確に推定する手法を検討していきます。

これらの増減要因を解明していくため、水産試験場では今後も資源動向のモニタリングを継続していくとともに、資源の持続的な利用に向けて調査研究を進めていきます。

3 似ていて紛らわしい魚 一カナガシラの仲間たち

底魚資源調査では、市場に水揚げしない小型サイズの漁獲物も持ち帰り、計数・測定を行います。時には似ている魚がいくつも混じることがあり、カナガシラ類がその典型です。カナガシラ類の中でも、カナガシラのほか、ソコカナガシラ、カナド、オニカナガシラの4種がよく含まれます。胸鰭の模様や顔の先端の棘の形などで見分られますが、外観は互いにそっくりな上に(図1)、実際の現場では鰭が寝ていたり欠けていたりして、同定に迷うことがあります。精度の高い資源量推定のため、このような魚も見誤らないよう、正確な種同定を心がけています。




図1 底魚資源調査で採捕されるカナガシラの仲間 (A: カナガシラ *L. microptera* ; B ソコカナガシラ *L. abyssalis* ; C: カナド *L. guentheri* ; D オニカナガシラ *L. smithii*)

4 ナガレメイタガレイの色彩変異個体

通常の体色とは異なる色彩を示す個体を「色彩変異個体」と言い、いくつかの魚種で稀に出現することが報告されています。ここでは、冬季の底魚資源調査において採捕されたナガレメイタガレイの色彩変異個体をご紹介します。本県沖でもよく漁獲されるナガレメイタガレイは、通常は眼のある側(有眼側)が茶褐色、眼のない側(無眼側)が白色をしています。この個体は有眼側に通常の茶褐色部分を残しつつも、大部分が色素を欠いた白色となっています。他方、無眼側は大部分が通常どおりの白色ですが、背鰭と臀鰭の基底に沿うように有眼側のような茶褐色の模様が出現しています。この変異がなぜ生じたのかは分かりませんが、少なくとも当場の調査では確認例がなく、珍しいことは間違いなさそうです。貴重な標本であることから、この個体は国立科学博物館(NSMT)に登録・収蔵していただきました。

(定着性資源部 多賀・外山・水谷・西)




図2 底魚資源調査で採捕されたナガレメイタガレイ *Pleuronichthys cornutus* (NSMT-P 154093, 体長 148.3 mm, 波崎沖水深約 100 m, 2025年11月27日)

次回の水産の窓「ヒラメ資源状況」は2月20日の発行を予定しています。