


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2016年11月11日
 水揚港 : 銚子
 漁場 : N 38°34'
 E 141°53'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	35.8	631.7	20
2	m	30.2	333.3	18
3	m	31.4	319.2	8
4	m	29.6	341.7	18
5	m	30.4	370.2	22
6	m	30.2	386.2	26
7	m	31.6	399.3	20
8	m	32.3	433.0	21
9	m	29.4	320.2	15
10	m	30.4	317.7	7
11	m	29.0	307.2	22
12	m	28.7	287.6	16
13	m	29.0	268.5	16
14	m	30.6	335.8	18
15	m	29.9	333.6	19
16	m	30.7	370.9	22
17	m	28.4	282.4	20
18	m	30.5	353.9	22
19	m	29.8	288.7	11
20	m	31.7	401.3	19
21	m	30.7	354.5	21
22	m	32.4	458.5	24
23	m	29.1	307.7	19
24	m	29.6	272.7	12
25	m	29.1	289.0	14
26	m	28.6	282.1	16
27	m	29.4	298.6	17
28	m	30.0	359.2	25
29	m	30.8	334.6	22
30	m	27.9	236.3	17

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

