


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2018年6月1日
 水揚港 : 銚子
 漁場 : N 35°46'
 E 141°00'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	30.8	340.7	6
2	m	29.6	298.0	5
3	m	28.9	254.7	5
4	m	29.3	279.2	7
5	m	29.8	295.0	5
6	m	28.1	238.2	7
7	m	25.1	166.6	7
8	m	25.2	171.2	9
9	g	26.2	189.7	6
10	m	29.2	292.6	6
11	m	28.4	262.7	7
12	m	29.0	254.4	6
13	g	26.1	205.3	6
14	m	24.6	145.4	5
15	m	26.5	208.0	7
16	m	24.6	156.6	6
17	m	25.0	160.8	6
18	m	27.5	216.6	6
19	m	27.0	202.3	6
20	m	23.5	142.3	6
21	m	23.9	136.5	6
22	g	25.8	185.2	6
23	m	30.3	311.1	5
24	m	27.1	202.0	6
25	g	25.7	179.4	7
26	m	28.3	249.5	7
27	m	27.6	232.2	6
28	m	26.8	228.1	7
29	g	26.3	192.8	6
30	g	26.6	199.5	5

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

