


# サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2019年2月6日  
 水揚港 : 銚子  
 漁場 : N 36°47'  
 E 141°09'

m マサバ  
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	33.7	497.9	22
2	m	35.8	519.8	9
3	m	33.5	439.2	16
4	m	33.7	449.3	15
5	m	31.6	367.2	15
6	m	29.3	238.5	5
7	m	28.6	248.0	7
8	m	31.4	319.0	8
9	m	28.4	248.1	11
10	m	31.4	314.7	15
11	m	32.8	385.7	13
12	m	29.7	276.4	8
13	m	30.9	371.9	19
14	m	30.2	303.4	14
15	m	31.3	379.3	17
16	m	29.1	253.9	8
17	m	31.7	350.6	15
18	m	28.7	251.5	11
19	m	31.8	343.9	11
20	m	31.8	334.4	9
21	m	30.4	320.6	15
22	m	31.3	342.8	8
23	m	32.7	365.3	7
24	m	31.0	356.4	15
25	m	31.3	339.4	12
26	m	30.4	338.7	15
27	m	33.3	405.3	9
28	m	31.2	326.2	10
29	m	31.4	381.0	18
30	m	31.6	332.6	14

測定機器：近赤外分光器（FQA-NIRGUN） 静岡シブヤ精機(株)製  
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

