


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2019年3月15日
 水揚港 : 銚子
 漁場 : N 35°38'
 E 141°03'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	30.7	315.2	5
2	m	27.9	202.6	3
3	m	28.5	231.7	6
4	m	28.4	215.2	6
5	m	27.5	240.9	10
6	m	27.9	220.7	4
7	m	29.2	258.8	8
8	m	27.2	223.1	6
9	m	29.3	244.6	4
10	m	33.6	379.0	3
11	m	31.1	317.8	6
12	m	29.6	280.6	7
13	m	31.8	323.4	9
14	m	31.8	346.9	11
15	m	28.8	247.9	6
16	m	30.6	299.6	5
17	m	30.4	308.2	9
18	m	30.9	303.1	6
19	m	28.8	249.1	5
20	m	31.9	357.1	10
21	m	32.0	382.4	13
22	m	30.8	334.5	12
23	m	30.3	281.2	5
24	m	29.5	269.8	8
25	m	28.4	222.8	4
26	m	28.1	228.5	5
27	m	29.8	284.8	7
28	m	29.1	258.0	5
29	m	27.6	212.8	5
30	m	30.8	302.9	6

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

