


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2020年3月19日
 水揚港 : 銚子
 漁場 : N 36°41'
 E 141°02'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	30.3	300.4	5
2	m	31.3	366.5	8
3	m	28.7	253.2	8
4	m	30.8	331.0	6
5	m	28.8	234.0	6
6	m	27.1	172.5	5
7	m	25.6	154.7	3
8	m	26.6	191.1	5
9	m	32.2	355.4	4
10	m	25.3	149.7	5
11	m	21.7	87.1	4
12	m	26.1	164.0	5
13	m	25.4	159.8	5
14	m	28.3	223.5	7
15	m	27.5	201.9	4
16	m	24.9	144.5	6
17	m	24.8	152.2	7
18	m	23.6	116.2	6
19	m	24.9	136.9	5
20	m	26.6	170.6	4
21	m	26.9	181.6	3
22	m	22.8	104.5	4
23	m	23.4	107.8	5
24	m	24.4	134.6	5
25	m	25.4	140.4	3
26	m	26.5	168.6	3
27	m	25.0	143.6	4
28	m	24.4	117.3	4
29	m	25.6	165.2	5
30	m	24.9	135.0	4

測定機器：近赤外分光器（FQA-NIRGUN） 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

