


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日：2026年1月20日
水揚港：銚子
漁場：N 35°52'
E 141°02'

m マサバ
g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長(cm)	体重(g)	推定脂肪量(%)
1	m	31.3	331.3	13
2	m	29.1	262.6	6
3	m	28.8	260.8	9
4	m	29.6	310.5	6
5	m	28.2	215.5	4
6	m	26.6	184.6	5
7	m	27.6	228.0	6
8	m	25.9	159.2	5
9	m	27.6	220.5	6
10	m	27.5	233.3	7
11	m	29.2	257.5	6
12	m	27.7	242.4	6
13	m	26.7	188.1	6
14	m	26.0	172.7	7
15	m	23.6	133.3	9
16	m	24.1	127.4	2
17	m	22.1	117.6	7
18	m	20.0	76.2	5
19	m	21.7	105.7	7
20	m	20.9	88.0	4
21	m	20.9	81.3	5
22	m	22.1	96.0	7
23	m	21.1	83.5	4
24	m	21.4	94.3	7
25	m	22.3	108.8	8
26	m	20.5	76.6	5
27	m	20.1	74.8	8
28	m	20.9	76.4	3
29	m	19.9	75.2	7
30	m	18.8	60.9	3

測定機器：近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製
※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。



茨城県水産試験場回遊性資源部
TEL: 029-262-4172