


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日：2026年2月2日
水揚港：銚子
漁場：N 35°58'
E 140°53'

m マサバ
g ゴマサバ



測定機器：近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製
※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。



No.	m/g	尾叉長(cm)	体重(g)	推定脂肪量(%)
1	m	23.4	136.6	7
2	m	23.6	128.9	4
3	m	22.0	108.5	4
4	m	22.5	118.5	5
5	m	21.9	97.5	4
6	m	22.9	111.4	4
7	m	20.8	91.7	3
8	m	21.0	82.8	4
9	m	21.0	115.8	3
10	m	19.6	74.4	4
11	m	20.2	73.0	2
12	m	21.3	96.5	5
13	m	21.5	104.1	7
14	m	20.3	86.4	6
15	m	20.9	83.8	2
16	m	22.5	120.4	2
17	m	22.9	106.0	6
18	m	21.9	99.8	2
19	m	21.4	96.2	6
20	m	21.0	92.8	3
21	m	22.0	104.6	4
22	m	20.0	80.7	4
23	m	21.6	101.6	3
24	m	20.8	80.4	3
25	m	20.0	78.9	3
26	m	20.7	86.4	5
27	m	19.5	66.8	2
28	m	19.6	70.9	2
29	m	19.3	64.1	2
30	m	18.3	58.0	3

茨城県水産試験場回遊性資源部

TEL: 029-262-4172