


カタクチイワシ卵密度(個体密度/㎡)

| R7  | 4月    | 5月    | 6月    | 7月   | 8月   | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  |
|-----|-------|-------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 大津沖 | 0.1   | 1.4   | 6.7   | 0.1  | 43.7 | 0.0 | —   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 会瀬沖 | 0.8   | 60.7  | 38.5  | 6.0  | 4.9  | 0.3 | —   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大洗沖 | 13.8  | 428.2 | 121.2 | 10.7 | 1.7  | 0.7 | 0.7 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
| 大竹沖 | 105.7 | 81.5  | 25.8  | 66.9 | 2.2  | 1.4 | 9.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 荒野沖 | 30.2  | 69.4  | 6.0   | 10.8 | 0.1  | 4.4 | —   | 0.2 | 0.0 | —   |



※ カタクチイワシの卵は全ての調査点で確認できませんでしたが、大津・大洗・大竹沖でマイワシの卵が確認されました。  
36° 02'45"付近の水深12mでシラスの極小反応を確認しました。