

湖沼観測結果(北浦)

観測日 令和7年3月6日


水温 単位 °C

調査点	水原	釜谷	宇崎	白浜	天掛	江川	札	馬渡
観測時間	11:20	11:12	11:06	10:49	10:38	10:12	10:04	9:52
水深(m) ^{※1}	4.8	5.5	6.2	5.4	6.0	5.7	6.1	4.5
0.5	8.4	8.3	8.3	8.2	8.1	8.3	8.5	8.6
1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.4	8.4
2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.4	8.3
3	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.3	8.3
4	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.3	8.3
5	—	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.3	—
6	—	—	8.0	—	—	—	8.3	—

溶存酸素量(DO)^{※2} 単位 mg/L

調査点	水原	釜谷	宇崎	白浜	天掛	江川	札	馬渡
観測時間	11:20	11:12	11:06	10:49	10:38	10:12	10:04	9:52
水深(m) ^{※1}	4.8	5.5	6.2	5.4	6.0	5.7	6.1	4.5
0.5	12.7	12.8	12.6	12.6	12.1	12.3	11.7	11.3
1	12.8	12.7	12.6	12.6	12.1	12.3	11.5	11.2
2	12.4	12.2	12.2	12.3	12.0	12.1	11.3	10.6
3	12.0	11.7	11.8	12.0	12.0	11.8	10.9	10.5
4	11.7	11.6	11.6	11.7	11.9	11.6	10.8	10.4
5	—	11.6	11.6	11.6	11.9	11.5	10.7	—
6	—	—	11.5	—	—	—	10.5	—

※1 水深は濁度の値が跳ね上がった(着底した)際の深度である。
 ※2 DOの値は、魚介類が生息するには3mg/L以上あることが望ましい。



- 調査点は左図のとおり
 - 観測順及び調査点の名称は以下のとおり
- | | |
|------|------|
| 1 馬渡 | 7 釜谷 |
| 2 札 | 8 水原 |
| 3 江川 | |
| 4 天掛 | |
| 5 白浜 | |
| 6 宇崎 | |