

湖沼観測結果(北浦)


観測日 令和8年8月6日

水温								単位 °C
調査点	水原	釜谷	宇崎	白浜	天掛	江川	札	馬渡
観測時間	11:29	11:23	11:16	11:00	10:53	10:37	10:02	9:47
水深(m) ^{※1}	4.6	5.1	5.8	5.7	6.4	5.7	5.9	4.2
0.5	27.6	27.9	28.2	28.1	28.0	28.1	27.8	27.7
1	27.5	27.5	27.9	27.7	27.9	28.0	27.7	27.6
2	27.3	27.3	27.6	27.5	27.6	27.9	27.5	27.5
3	27.1	27.2	27.5	27.4	27.5	27.8	27.5	27.4
4	27.0	27.2	27.4	27.3	27.5	27.7	27.4	27.2
5	—	27.2	27.4	27.3	27.5	27.5	27.4	—
6	—	—	—	—	27.4	—	—	—

溶存酸素量(DO) ^{※2}								
調査点	水原	釜谷	宇崎	白浜	天掛	江川	札	馬渡
観測時間	11:29	11:23	11:16	11:00	10:53	10:37	10:02	9:47
水深(m) ^{※1}	4.6	5.1	5.8	5.7	6.4	5.7	5.9	4.2
0.5	9.5	9.7	9.2	9.4	9.6	11.5	9.2	12.6
1	9.1	9.3	9.3	9.0	9.7	11.1	8.9	12.4
2	8.6	8.1	8.4	7.8	8.8	10.3	7.2	11.5
3	7.9	7.5	8.0	7.6	8.0	9.4	6.4	10.7
4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.8	8.9	6.1	9.4
5	—	7.2	7.4	6.7	7.7	7.6	6.8	—
6	—	—	—	—	7.6	—	—	—

※1 水深は濁度の値が跳ね上がった(着底した)際の深度である。

※2 DOの値は、魚介類が生息するには3mg/L以上あることが望ましい。



- 調査点は左図のとおり
 - 観測順及び調査点の名称は以下のとおり
- | | |
|------|------|
| 1 馬渡 | 7 釜谷 |
| 2 札 | 8 水原 |
| 3 江川 | |
| 4 天掛 | |
| 5 白浜 | |
| 6 宇崎 | |