

湖沼観測結果(北浦)


観測日 令和8年9月1日

水温								単位 °C
調査点	水原	釜谷	宇崎	白浜	天掛	江川	札	馬渡
観測時間	11:14	11:08	11:01	10:44	10:41	10:27	10:21	10:04
水深(m) ^{※1}	4.3	5.1	6.1	5.7	6.5	5.4	5.8	4.3
0.5	26.2	26.3	26.5	26.6	26.7	26.9	27.0	26.6
1	26.2	26.3	26.5	26.6	26.7	26.9	27.0	26.6
2	26.2	26.3	26.5	26.5	26.7	26.9	27.0	26.6
3	26.2	26.3	26.5	26.5	26.7	26.9	26.9	26.5
4	26.0	26.3	26.4	26.5	26.7	26.9	26.9	26.5
5	—	26.3	26.4	26.5	26.7	26.8	26.9	—
6	—	—	26.4	—	26.7	—	—	—

溶存酸素量 (DO) ^{※2}								
調査点	水原	釜谷	宇崎	白浜	天掛	江川	札	馬渡
観測時間	11:14	11:08	11:01	10:44	10:41	10:27	10:21	10:04
水深(m) ^{※1}	4.3	5.1	6.1	5.7	6.5	5.4	5.8	4.3
0.5	6.7	7.1	6.8	7.0	6.4	6.8	6.8	9.7
1	6.7	7.1	6.8	6.9	6.3	6.8	6.7	9.5
2	6.7	7.0	6.8	6.8	6.3	6.7	6.6	9.4
3	6.7	7.0	6.7	6.7	6.3	6.7	6.6	9.0
4	6.7	6.9	6.7	6.7	6.2	6.7	6.5	8.5
5	—	6.7	6.6	6.5	6.2	6.6	6.3	—
6	—	—	6.4	—	6.2	—	—	—

※1 水深は濁度の値が跳ね上がった(着底した)際の深度である。

※2 DOの値は、魚介類が生息するには3mg/L以上あることが望ましい。



- 調査点は左図のとおり
- 観測順及び調査点の名称は以下のとおり
- 1 馬渡 7 釜谷
- 2 札 8 水原
- 3 江川
- 4 天掛
- 5 白浜
- 6 宇崎