湖沼観測結果（北浦）

観測日　　令和8年11月4日


水温　　単位　℃

調査点	水原	釜谷	宇崎	白浜	天掛	江川	札	馬渡
観測時間	11:08	11:01	10:54	10:38	10:30	10:13	10:08	9:50
水深（m）※1	4.5	5.2	6.1	5.7	6.6	5.5	5.9	4.2
0.5	17.7	17.7	18.3	18.0	18.2	18.0	17.8	17.2
1	17.7	17.7	18.3	18.0	18.2	18.0	17.8	17.1
2	17.7	17.7	18.3	18.0	18.2	18.0	17.8	17.1
3	17.7	17.6	18.3	18.0	18.2	18.0	17.7	17.1
4	17.6	17.6	18.3	18.0	18.2	18.0	17.7	17.1
5	—	17.6	18.2	18.0	18.2	18.0	17.7	—
6	—	—	※3 18.2	—	18.2	—	—	—

溶存酸素量（DO）※2

調査点	水原	釜谷	宇崎	白浜	天掛	江川	札	馬渡
観測時間	11:08	11:01	10:54	10:38	10:30	10:13	10:08	9:50
水深（m）※1	4.5	5.2	6.1	5.7	6.6	5.5	5.9	4.2
0.5	9.7	9.0	9.7	8.6	8.2	8.0	7.5	8.3
1	9.7	9.1	9.7	8.6	8.4	8.0	7.5	8.3
2	9.6	9.0	9.7	8.5	8.4	8.0	7.5	8.3
3	9.5	9.0	9.6	8.5	8.1	8.0	7.5	8.3
4	9.4	8.9	9.6	8.4	8.0	8.0	7.6	8.2
5	—	8.9	9.6	8.4	7.9	8.0	7.7	—
6	—	—	※3 9.6	—	7.9	—	—	—

※1　水深は濁度の値が跳ね上った（着底した）際の深度である。
※2　DOの値は、魚介類が生息するには3mg/L以上あることが望ましい。
※3　測定深度が水深とほぼ同じで、水中の水温DOの値が記録されなかったため、底層直上（水深−0.5m）の値を記載した。



○　調査点は左図のとおり
○　観測順及び調査点の名称は以下のとおり

1　馬渡
2　札
3　江川
4　天掛
5　白浜
6　宇崎
7　釜谷
8　水原