

## 絶滅危惧 I B類

### トネハナヤスリ

*Ophioglossum namegatae* M.Nishida et Kurita

ハナヤスリ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 絶滅危惧 II 類 (VU)

分 布 本州（関東地方の利根川流域）〔日本固有種〕

生 育 地 氾濫原に生える。取手市の利根川や常総市の小貝川の河川敷などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，河川の改修

そ の 他 取手市利根川河川敷などで発見されたのでトネの名がついた。



坂東市（内山）

### カラクサシダ

*Pleurosoriopsis makinoi* (Maxim. ex Makino) Fomin

ミズワラビ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州（最南部を除く）  
／シベリア東部・中国・朝鮮

生 育 地 深山の岩上や樹幹に着き，湿ったコケに埋まって生える。北茨城市，常陸太田市，筑波山，加波山などに生育する。

選 定 理 由 生育地点や個体数が少ない，森林の伐採

そ の 他



筑波山（内山）

### シシラン

*Haplopteris flexuosa* (Fee) E.H.Crane

シシラン科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州（関東地方以西）・四国・九州・琉球／朝鮮・中国・ヒマラヤからマレーシア

生 育 地 山林中の岩上や樹幹に着生する。御前山，常陸大宮市，大子町に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



常陸大宮市（内山）

## アマクサシダ

*Pteris dispar* Kunze

イノモトソウ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州（関東地方以西・ただし日本海側にはない）・四国・九州・琉球／朝鮮・台湾・中国

生 育 地 暖地の山麓にかけて生える。つくば市、かすみがうら市などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



常総市（内山）

## ナンタイシダ

*Athyriumohra maximowiczii* (Baker) Sugim.

オシダ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（東北地方南部から近畿地方）／朝鮮（済州島）

生 育 地 温帯林の林下に生える。県内では，筑波山が唯一の生育地である。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



筑波山（中崎）

## メヤブソテツ

*Cyrtomium caryotideum* (Wall. ex Hook. et Grev.) C.Presl

オシダ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東地方・中部地方南東部・紀伊半島）・四国・九州／ヒマラヤから台湾にかけての各地・フィリピン・ハワイ

生 育 地 山地に生じ，石灰岩地での土のたまった岩隙などに生える。常陸太田市や常陸大宮市などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（藤田）

絶滅

絶滅危惧 I A類

絶滅危惧 I B類

絶滅危惧 II類

準絶滅危惧

情報不足  
①注目種

情報不足  
②現状不明種

## サイゴクベニシダ

*Dryopteris championii* (Benth.) C.Chr. ex Ching

オシダ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州（宮城県・新潟県と関東地方以西）・四国・九州（最南部を除く）／朝鮮・中国

生 育 地 低山地の林下のやや乾いた斜面や山麓、村落に生える。常陸大宮市、笠間市、行方市、潮来市、水戸市、石岡市などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない、森林の伐採

そ の 他



常陸大宮市（内山）

## シラネワラビ

*Dryopteris expansa* (C.Presl) Fraser-Jenk. et Jermy subsp. *assimilis* (S.Walker) Tzvelev

オシダ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／北半球の温帯

生 育 地 温帯林の林下に生える。北茨城市、大子町などにまれに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない、森林の伐採

そ の 他



北茨城市（内山）

## キヨズミオオクジャク

*Dryopteris namegatae* (Sa.Kurata) Sa.Kurata

オシダ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東地方以西）・四国・九州／中国（四川省）

生 育 地 山地の林中に生える。笠間市、石岡市に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない、森林の伐採

そ の 他



（県博収蔵標本：笠間市産）



## ナガバノイタチシダ

*Dryopteris sparsa* (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze

オシダ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（千葉県南部以南）・四国・九州・琉球  
／台湾・中国・インドからマレーシア

生 育 地 低山地の林下に生える。桜川市、笠間市、石岡市などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



石岡市（内山）

## ホソイノデ

*Polystichum braunii* (Spenn.) Fee

オシダ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州（中部以北・鳥取県・山口県）  
／朝鮮・中国・ソビエト・ヨーロッパ・北ア  
メリカ・北半球の温帯

生 育 地 温帯林の林下に生える。水戸市や大子町など  
に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



大子町（中崎）

## チャボイノデ

*Polystichum igaense* Tagawa

オシダ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東から近畿地方）・四国・九州（宮崎県）  
[日本固有種]

生 育 地 山地の林床に生える。大子町に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



大子町（中崎）

絶滅

絶滅危惧 I A類

絶滅危惧 I B類

絶滅危惧 II類

準絶滅危惧

情報不足  
①注目種

情報不足  
②現状不明種



## カタイノデ

*Polystichum makinoi* (Tagawa) Tagawa

オシダ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東地方以西）・四国・九州（宮崎県）

生 育 地 山地の林下に生える。大子町に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



大子町（中崎）

## サイゴクイノデ

*Polystichum pseudomakinoi* Tagawa

オシダ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東地方・能登半島）・四国・九州／中国

生 育 地 山地の林下に生える。大子町に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



大子町（中崎）

## ヒカゲワラビ

*Diplazium chinense* (Baker) C.Chr.

メシダ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012

分 布 本州（関東地方以西）・四国・九州・奄美諸島の沖永良部島／朝鮮済州島・中国・インドシナ

生 育 地 山地の林下のやや陰湿な場所に生える。稲敷市に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



稲敷市（内山）

絶滅

絶滅危惧 I A類

絶滅危惧 I B類

絶滅危惧 II類

準絶滅危惧

情報不足  
①注目種

情報不足  
②現状不明種

## ノギリシダ

*Diplazium wichurae* (Mett.) Diels

メシダ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州（福島県南部・関東地方・能登半島以西）・四国・九州・琉球・小笠原／朝鮮南部・台湾・中国

生 育 地 山地林下の陰湿な地上か岩上に生える。つくば市、石岡市や北茨城市に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない、森林の伐採

そ の 他



北茨城市（内山）

## エビラシダ

*Gymnocarpium oyamense* (Baker) Ching

メシダ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州（関東地方から近畿地方）・四国／ネパール・中国・台湾・フィリピン・ニューギニア

生 育 地 山地の林下の陰湿な岩壁と岩石地に生える。大子町に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない、森林の伐採

そ の 他



大子町（藤田）

## コガネシダ

*Woodsia macrochlaena* Mett. ex Kuhn

メシダ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／朝鮮・中国北部・ソビエト東部

生 育 地 山地林下や林縁の岩上に生える。久慈山地に生育する。

選 定 理 由 生育地点や個体数が少ない

そ の 他



男体山（内山）

絶滅

絶滅危惧 I A類

絶滅危惧 I B類

絶滅危惧 II類

準絶滅危惧

情報不足  
①注目種

情報不足  
②現状不明種

## サジラン

*Loxogramme duclouxii* H.Christ

ウラボシ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012

分 布 本州（福島県以西）・四国・九州／ヒマラヤ・中国（西・南部）・タイ・台湾・朝鮮（済州島）

生 育 地 山地林中の岩上や樹幹に着生する。常陸太田市に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

## クリハラン

*Neochheiropteris ensata* (Thunb.) Ching

ウラボシ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州（関東地方以西）・四国・九州・沖縄本島／朝鮮の済州島・台湾の高山・中国からインドシナにかけて

生 育 地 山林中の地上やまれに湿った岩上に生える。吾国山，土浦市，北茨城市などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



北茨城市（内山）

## オシャグジデンド

*Polypodium fauriei* H.Christ

ウラボシ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 北海道から九州（中央山地）／朝鮮（済州島）・南千島

生 育 地 深山の樹幹や岩上に着生する。八溝山などに生育する。

選 定 理 由 個体数が少ない，森林の伐採

そ の 他



（県博収蔵標本：加波山産）



## サンショウモ

*Salvinia natans* (L.) All.

サンショウモ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧 II 類 (VU)

分 布 本州・四国（瀬戸内側）・九州（西部）ノヨーロッパ・アジア・アフリカ・アメリカ

生 育 地 水田や池沼の水面に生育する。県内各地に見られるが、生育地は減少している。

選 定 理 由 農地の改修、農薬の使用

そ の 他



常陸太田市（内山）

## ツガ

*Tsuga sieboldii* Carriere

マツ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（福島県八溝山以西）・四国・九州（屋久島）ノ朝鮮の鬱陵島

生 育 地 山地に生える。八溝山や竜神峡などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない、森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

## サクラバハノキ

*Alnus trabeculosa* Hand.-Mazz.

カバノキ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州（茨城県・新潟県以西）・九州（宮崎県）ノ中国（南東部）

生 育 地 湿地にまれに生える。県内では、高萩市が唯一の生育地である。

選 定 理 由 生育地点が少ない

そ の 他



日立市（内山）

絶滅

絶滅危惧 I A 類

絶滅危惧 I B 類

絶滅危惧 II 類

準絶滅危惧

情報不足  
①注目種

情報不足  
②現状不明種

## トキホコリ

*Elatostema densiflorum* Franch. et Sav. ex Maxim.

イラクサ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧 II類 (VU)

分 布 北海道西南部・本州中部 [日本固有種]

生 育 地 低地の湿ったところに生える。佐白山, 水戸市, 常陸太田市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採, 登山者による踏みつけ

そ の 他



常陸大宮市 (藤田)

## ミヤマツチトリモチ

*Balanophora nipponica* Makino

ツチトリモチ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012 絶滅危惧 II類 (VU)

分 布 本州 (秋田県・岩手県以南)・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 落葉樹林下に生える。北茨城市に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない, 森林の伐採

そ の 他



北茨城市 (内山)

## コギシギシ

*Rumex dentatus* L. subsp. *nipponicus* (Franch. et Sav.) Rech.f.

タデ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧 II類 (VU)

分 布 本州 (関東以西)・四国・九州/朝鮮・中国 (本土・台湾)

生 育 地 日当たりのよい原野に生える。鬼怒川や利根川などに生育する。

選 定 理 由 河川の改修

そ の 他



牛久市 (丸山)

## マルミノヤマゴボウ

*Phytolacca japonica* Makino

ヤマゴボウ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（関東以西）・四国・九州

生 育 地 山地の林下に生える。男体山などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



男体山（中崎）

## ワチガイソウ

*Pseudostellaria heterantha* (Maxim.) Pax

ナデシコ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州（福島県以南）・四国・九州／中国

生 育 地 山地の林下に生える。筑波山，大子町などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

## ヒナワチガイソウ

*Pseudostellaria heterantha* (Maxim.) Pax var. *linearifolia* (Takeda) Nemoto

ナデシコ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012 絶滅危惧 II 類 (VU)

分 布 本州（茨城県・千葉県・東京都・三重県・愛媛県）  
[日本固有種]

生 育 地 山地の林下に生える。筑波山に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採。

そ の 他



桜川市（内山）

絶滅

絶滅危惧 I A 類

絶滅危惧 I B 類

絶滅危惧 II 類

準絶滅危惧

情報不足  
①注目種

情報不足  
②現状不明種



## アズマレイジンソウ

*Aconitum pterocaule* Koidz.

キンポウゲ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州中部の主として日本海側 [日本固有種]

生 育 地 林中や林縁に生える。八溝山や筑波山に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町 (内山)

## ミチノクフクジュソウ

*Adonis multiflora* Nishikawa et Koji Ito

キンポウゲ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州 (東北地方から中部地方)・九州

生 育 地 温帯の落葉樹林下に生える。大子町などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない, 園芸採取

そ の 他



大子町 (中崎)

## フクジュソウ

*Adonis ramosa* Franch.

キンポウゲ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮, 中国 (東北), シベリア東部

生 育 地 温帯の落葉樹林下に生える。常陸大宮市, 高萩市, 北茨城市などに生育する。

選 定 理 由 園芸採取

そ の 他



北茨城市 (内山)

## エンコウソウ

*Caltha palustris* L. var. *enkoso* H.Hara

キンポウゲ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州・北海道／千島・樺太

生 育 地 浅い水中や湿地に生える。城里町，大子町に生育するが，個体数は減少している。

選 定 理 由 園芸採取

そ の 他



城里町（内山）

## スハマソウ

*Hepatica nobilis* Schreb. var. *japonica* Nakai f. *variegata* (Makino) Nakai

キンポウゲ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州・四国／ヨーロッパ・東アジア

生 育 地 落葉広葉樹林の林下に生える。大子町，常陸太田市などに生育地があるが，生育環境が悪化している。

選 定 理 由 園芸採取，森林の伐採

そ の 他



大子町（内山）

## ヒメウス

*Semiaquilegia adoxoides* (DC.) Makino

キンポウゲ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州（関東地方以西）・四国・九州／朝鮮南部・中国

生 育 地 人里に近い山すそや道ばたの草むらや石垣に生える。牛久市や常総市などにまれに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない

そ の 他



牛久市（内山）

絶滅

絶滅危惧 I A類

絶滅危惧 I B類

絶滅危惧 II類

準絶滅危惧

情報不足  
①注目種

情報不足  
②現状不明種

## シキンカラマツ

*Thalictrum rochebrunianum* Franch. et Sav.

キンポウゲ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（長野県・群馬県・福島県）

生 育 地 木陰の湿った草地に生える。北茨城市に生育するが、生育環境悪化により、個体数は減少している。

選 定 理 由 生育地点が少ない、草地の開発、遷移の進行

そ の 他



北茨城市（内山）

## ジュンサイ

*Brasenia schreberi* J.F.Gmel.

スイレン科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州・琉球

生 育 地 底に有機物が堆積した古い池に生える。県内では数か所に生育する。

選 定 理 由 湖岸の埋立、水質の汚濁

そ の 他



常陸太田市（内山）

## ヒツジグサ

*Nymphaea tetragona* Georgi

スイレン科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道・四国・九州／ヨーロッパ・シベリア・東アジア・インド北部

生 育 地 古い池や沼に生える。県内数か所に生育する。

選 定 理 由 湖岸の埋立、水質の汚濁

そ の 他



常陸太田市（内山）

絶滅

絶滅危惧 I A類

絶滅危惧 I B類

絶滅危惧 II類

準絶滅危惧

情報不足  
①注目種

情報不足  
②現状不明種



## ベニバナヤマシャクヤク

*Paeonia obovata* Maxim.

ボタン科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 絶滅危惧 II 類 (VU)

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・中国（北部）・樺太

生 育 地 落葉広葉樹林下に生える。大子町や八溝山などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，園芸採取，森林の伐採

そ の 他 ケナシベニバナヤマシャクヤクを含む。



大子町（清水）

## コモウセンゴケ

*Drosera spathulata* Labill.

モウセンゴケ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012

分 布 本州（宮城県以南）・四国・九州・琉球／中国（本土・台湾）・東南アジア・オーストラリア

生 育 地 日当たりのよい酸性の湿地に生える。北茨城市，高萩市などに生育するが個体数は減少している。

選 定 理 由 湿地の開発，農地の改修，遷移の進行

そ の 他



高萩市（森本）

## イワハタザオ

*Arabis serrata* Franch. et Sav. var. *japonica* (H.Boissieu) Ohwi

アブラナ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州中北部

生 育 地 山地に生える。県内の生育地は大子町，男体山，竜神峡などの久慈山地に限られている。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



大子町（内山）

絶滅

絶滅危惧 I A 類

絶滅危惧 I B 類

絶滅危惧 II 類

準絶滅危惧

情報不足  
①注目種

情報不足  
②現状不明種

## オオチチッパベンケイ

*Hylotelephium sordidum* (Maxim.) H.Ohba var. *oishii* (Ohwi) H.Ohba et M.Amano

ベンケイソウ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類  
茨城県1997 危急種  
環境省2012 絶滅危惧 I B類 (EN)

分 布 本州北部（多雪地帯に多い）〔日本固有種〕

生 育 地 山地の岩上、まれに樹上または屋根上に生える。主に久慈山地に生育するが個体数は少ない。

選 定 理 由 生育地点が少ない、森林の伐採

そ の 他



大子町（内山）

## ヒメレンゲ

*Sedum subtile* Miq.

ベンケイソウ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類  
茨城県1997 危急種  
環境省2012

分 布 本州（関東以西）・四国・九州／中国・ヒマラヤ東部

生 育 地 沢沿いの岩上に生える。県内の生育地は久慈山地に限られている。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町（藤田）

## アズマツメクサ

*Tillaea aquatica* L.

ベンケイソウ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類  
茨城県1997  
環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 北海道・本州／北半球の温帯

生 育 地 水田や海浜泥地に生える。常総市などの湿地に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない、湿地の開発、遷移の進行

そ の 他



常総市（小松崎）

## イワネコノメソウ

*Chrysosplenium echinus* Maxim.

ユキノシタ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東・東海地方）・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 温帯林の沢に沿う陰湿地に生える。八溝山や北茨城市に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



北茨城市（内山）

## ヤグルマソウ

*Rodgersia podophylla* A.Gray

ユキノシタ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 北海道西南部・本州／朝鮮

生 育 地 谷沿いの林下に生える。北茨城市と八溝山の2か所に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



大子町（内山）

## ミヤマザクラ

*Cerasus maximowiczii* (Rupr.) Kom.

バラ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州の温帯から亜寒帯／朝鮮・中国（東北）・ウスリー・樺太

生 育 地 山地の上部から亜高山に生える。また，蛇紋岩地帯や石灰岩地帯にも見られる。県内では，筑波山が唯一の生育地である。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



筑波山（内山）

絶滅

絶滅危惧 I A類

絶滅危惧 I B類

絶滅危惧 II類

準絶滅危惧

情報不足  
①注目種

情報不足  
②現状不明種



## アズマイバラ

*Rosa onoei* Makino var. *oligantha* (Franch. et Sav.) H. Ohba

バラ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（宮城県以南・愛知県豊川以東）〔日本固有種〕

生 育 地 丘陵地、低山地に生える。県内では、筑波山が唯一の生育地である。

選 定 理 由 生育地点が少ない、森林の伐採

そ の 他



筑波山（内山）

## コジキイチゴ

*Rubus sumatranus* Miq.

バラ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（関東・中部地方以西）・四国・九州／朝鮮南部・中国大陸・台湾

生 育 地 暖地に生える。つくば市、城里町、御前山などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない、森林の伐採

そ の 他



御前山（内山）

## ナガボノアカワレモコウ

*Sanguisorba tenuifolia* Fisch. ex Link var. *purpurea* Trautv. et Mey. (102)

バラ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州（西部）・四国・九州／朝鮮・中国（東北）

生 育 地 湿地などに生える。神栖市、稲敷市、小貝川などに生育する。

選 定 理 由 河川の改修

そ の 他



稲敷市（内山）

## ナンキンナナカマド

*Sorbus gracilis* (Siebold et Zucc.) K.Koch

バラ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（福島県・新潟県以西）・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 山地に生える。八溝山，竜神峡などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



大子町（内山）

## イタチササゲ

*Lathyrus davidii* Hance

マメ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・九州／朝鮮・中国（北部・東北）・ウスリー

生 育 地 山地の草原，林縁に生える。大子町と水戸市に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，草地の開発，遷移の進行

そ の 他



（中崎収蔵標本：大子町産）

## マルミノウルシ

*Euphorbia ebracteolata* Hayata

トウダイグサ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012 準絶滅危惧（NT）

分 布 本州（関東地方以北）／中国の中部から朝鮮半島

生 育 地 山地の開けた草地などに生える。大子町に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



大子町（中崎）

絶滅

絶滅危惧 I A類

絶滅危惧 I B類

絶滅危惧 II類

準絶滅危惧

情報不足  
①注目種

情報不足  
②現状不明種

## カラコギカエデ

*Acer ginnala* Maxim. var. *aidzuense* (Franch.) K.Ogata

カエデ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／東シベリア・中国（東北）・朝鮮 [日本固有種]

生 育 地 低山の湿地の林内に生える。小貝川などに生育する。

選 定 理 由 河川の改修，湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



笠間市（内山）

## コガンピ

*Diplomorpha ganpi* (Siebold et Zucc.) Nakai

ジンチョウゲ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州（群馬県赤城山および茨城県・福井県東部以西）・四国・九州（奄美諸島）／台湾

生 育 地 日当たりのよい山野に生える。日立市，笠間市などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，草地の開発，遷移の進行

そ の 他



常陸太田市（内山）

## ナガハシスミレ

*Viola rostrata* Pursh

スミレ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州北部から鳥取県の日本海側 [日本固有種]

生 育 地 山地に生える。鶏足山塊に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



城里町（内山）



## ミズキンバイ

*Ludwigia peploides* (Kunth) Raven subsp. *stipulacea* (Ohwi) Raven

アカバナ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧 II 類 (VU)

分 布 北海道・四国・九州／中国（台湾・海南島）

生 育 地 沼沢地に生える。行方市に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，溜池の埋立

そ の 他



水戸市（内山）

## フサモ

*Myriophyllum verticillatum* L.

アリノトウグサ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／ヨーロッパ・アフリカ北部・アジア・北アメリカ

生 育 地 池や沼に生える。常陸太田市などに生育する。

選 定 理 由 溜池の埋立，水質の汚濁

そ の 他



常陸太田市（村上）

## エキサイゼリ

*Apodicarpum ikenoi* Makino

セリ科

茨城県2012 絶滅危惧 I B類

茨城県1997 危急種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州（関東地方と愛知県）〔日本固有種〕

生 育 地 湿地に生える。小貝川などに生育する。

選 定 理 由 河川の改修，湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



常総市（内山）

絶滅

絶滅危惧 I A類

絶滅危惧 I B類

絶滅危惧 II類

準絶滅危惧

情報不足  
①注目種

情報不足  
②現状不明種