

絶滅危惧Ⅱ類

マンネンスギ

Lycopodium dendroideum Michx.

ヒカゲノカズラ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／東アジア～北アメリカ

生 育 地 山地の林下や陽地に生える。県北山地の林下や、まれに笠間市、小美玉市などの平地林にも生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

コヒロハハナヤスリ

Ophioglossum petiolatum Hook.

ハナヤスリ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（東北地方中部以南）・四国・九州・琉球／世界の熱帯・亜熱帯

生 育 地 山野の路傍、林下などに生える。常陸太田市、笠間市、那珂市、行方市、古河市、常総市などに生育する。

選 定 理 由 草地の開発、遷移の進行

そ の 他



（県博収蔵標本：石岡市産）

コハナヤスリ

Ophioglossum thermale Kom. var. *nipponicum* (Miyabe et Kudo) M.Nishida

ハナヤスリ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／中国・台湾

生 育 地 人工的な環境（墓地や芝地）に出現しやすい。笠間市、結城市などに生育する。

選 定 理 由 草地の開発、遷移の進行

そ の 他



水戸市（内山）

ハマハナヤスリ

Ophioglossum thermale Kom. var. *thermale*

ハナヤスリ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州・琉球／シベリアから中国・台湾の東アジア・ミクロネシア

生 育 地 海岸の砂浜や日当たりのよい湿地などに生える。高萩市，常陸太田市，笠間市，阿見町などに生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



(県博収蔵標本：土浦市産)

オオバノハチジョウシダ

Pteris excelsa Gaudich.

イノモトソウ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州(東北地方南部以南)・四国・九州／朝鮮から中国中南部以南の東アジア，南アジアからオセアニア

生 育 地 暖地のやや湿り気のある山地の林下に生える。北茨城市，日立市，常陸太田市，大子町などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



北茨城市(内山)

オオカナワラビ

Arachniodes amabilis (Bl.) Tindale

オシダ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州(関東以西)・四国・九州／朝鮮，中国，フィリッピンとスリランカからマレーシア

生 育 地 暖地の山地の林下に生える。北茨城市，日立市，常陸太田市，かすみがうら市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



北茨城市(内山)

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ホソバカナワラビ

Arachniodes aristata (G.Forst.) Tindale

オシダ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（石川県・関東以西）・四国・九州・琉球

生 育 地 暖地のやや乾いた山地の林下に群生することが多い。北茨城市，潮来市，鹿嶋市，筑波山などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



筑波山（内山）

オニカナワラビ

Arachniodes caudata Ching

オシダ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（新潟県と福島県南部以西）・四国・九州

生 育 地 低山地のやや乾燥した林中の崖下や林下などに生え，群生することは少ない。県内各地に点々と生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



桜川市（福田）

コバノカナワラビ

Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike

オシダ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東地方以西の海岸沿い）・四国・九州／朝鮮，中国，台湾とマレーシアを東はニューギニア

生 育 地 暖地のやや乾燥した林下に生え，しばしば群生する。土浦市，かすみがうら市，つくば市に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



土浦市（福田）

イワヘゴ

Dryopteris cycadina (Franch. et Sav.) C.Chr.

オシダ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（山形県・新潟県で珍しく関東地方南部以西）・四国・九州／朝鮮済州島・インド・スリランカからヒマラヤ・中国・台湾

生 育 地 暖地の山地の林下に生え、群生することは少ない。北茨城市、城里町、常陸大宮市、笠間市、吾国山、行方市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸大宮市（内山）

オオクジャクシダ

Dryopteris dickinsii (Franch. et Sav.) C.Chr.

オシダ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道（奥尻島）・本州・四国・九州／中国

生 育 地 平地や山地のやや湿った林下などに生える。大子町、常陸大宮市、吾国山、水戸市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



水戸市（内山）

サクライカグマ

Dryopteris gymnophylla (Baker) C.Chr.

オシダ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（宮城県以南）・九州（大分県）／朝鮮・中国・タイ北部

生 育 地 平地から山地の斜面などに生える。大子町、桜川市、銚田市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



銚田市（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ヒメカナワラビ

Polystichum tsus-simense (Hook.) J.Sm.

オシダ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（福島県南端と関東地方以西）・四国・九州／朝鮮・中国（揚子江以南）・インドシナ・台湾

生 育 地 山地の林下の斜面や岩場の近くに生える。大子町，常陸太田市，日立市に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



真弓山（内山）

オオキヨズミシダ

Polystichum tsus-simense (Hook.) J.Sm. var. *mayebarae* (Tagawa) Sa.Kurata

オシダ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（福島県南端と関東地方以西）・四国・九州／中国

生 育 地 山地の林下の斜面や岩場の近くに生える。常陸太田市，日立市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

コハシゴシダ

Thelypteris angustifrons (Miq.) Ching

ヒメシダ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（新潟県・石川県・関東地方南部以西）・四国・九州・琉球／朝鮮・台湾・中国

生 育 地 暖地の林縁や路傍，谷津田の土手などに生える。県内各地に点々と生育する。

選 定 理 由 森林の伐採，草地の開発，遷移の進行

そ の 他



石岡市（福田）

ニッコウシダ

Thelypteris nipponica (Franch. et Sav.) Ching

ヒメシダ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州／朝鮮・中国

生 育 地 山地のやや湿った林下や湿地に群生して生える。北茨城市，高萩市，常陸太田市，鷄足山などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他 メニッコウシダを含む。



(県博収蔵標本：北茨城市産)

カラクサイヌワラビ

Athyrium clivicola Tagawa

メシダ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・中国

生 育 地 山地のやや湿った林下に生える。北茨城市の冷温帯林下に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



(県博収蔵標本：北茨城市産)

ヘラシダ

Deparia lancea (Thunb.) Fraser-Jenk.

メシダ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（関東地方中・南部以西）・九州・琉球／朝鮮・中国・台湾からフィリッピン

生 育 地 暖地の洪積台地斜面の湿り気のあるところや低山地のやや陰湿な林下に生える。北茨城市，石岡市，つくば市，鹿嶋市，稲敷市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



つくば市（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

オニヒカゲワラビ

Diplazium nipponicum Tagawa

メシダ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／中国

生 育 地 山地のやや陰湿な林下に生える。北茨城市、大子町、真弓山などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

ホテイシダ

Lepisorus annuifrons (Makino) Ching

ウラボシ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮

生 育 地 山地の岩上のくぼみや樹幹などに生える。北茨城市、常陸太田市、高萩市、大子町などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町（内山）

ミヤマノキシノブ

Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching var. *distans* (Makino) Tagawa

ウラボシ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 南千島・北海道・本州・四国・九州／朝鮮

生 育 地 冷温帯の樹幹や岩上に生える。八溝山、雨巻山、筑波山などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



筑波山（内山）

ヒメコマツ

Pinus parviflora Siebold et Zucc. var. *parviflora*

マツ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 北海道（南部）・本州・四国・九州

生 育 地 山地の尾根筋の斜面などに生える。北茨城市、大子町、高萩市、常陸太田市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町（内山）

イブキ

Juniperus chinensis L.

ヒノキ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州（岩手県以南）・四国・九州・主として太平洋側の海岸沿い

生 育 地 海岸の安定した岩場などに生え、大木になると幹がねじれたようになる。北茨城市、日立市などに生育する。

選 定 理 由 海岸の開発，森林の伐採

そ の 他 日立市にはいぶき山イブキ樹叢（国天然記念物）がある。



日立市（内山）

ダケカンバ

Betula ermanii Cham.

カバノキ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道・本州（中部以北）・四国

生 育 地 冷温帯から高山帯までの陽あたりのよい開放地に生える。八溝山頂付近などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



八溝山（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ウダイカンバ

Betula maximowicziana Regel

カバノキ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 南千島（国後島）・北海道・本州（岐阜県以北）
[日本固有種]

生 育 地 山地の日当たりのよい開放地に先駆的に侵入することが多い。肥沃な土地に生える。高萩市に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



北茨城市（内山）

シラカンバ

Betula platyphylla Sukaczew var. *japonica* (Miq.) H.Hara

カバノキ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道・本州（中部地方以北）／千島・樺太・朝鮮・中国・東シベリア

生 育 地 主に冷温帯の日当たりのよい開放地に生える。県北の山地や平地の那珂市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



北茨城市（内山）

ハシバミ

Corylus heterophylla Fisch. ex Besser var. *thunbergii* Blume

カバノキ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・九州／朝鮮・中国・ウスリー・アムール

生 育 地 日当たりのよい山野や湿地に接する林縁などに生える。日立市、那珂市、笠間市、小美玉市、つくば市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



小美玉市（丸山）

ハルニレ

Ulmus davidiana Planch. var. *japonica* (Rehder) Nakai

ニレ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・中国（東北・北部）

生 育 地 肥沃な沖積地，洪積台地斜面や山地に生える。北茨城市，高萩市，太子町，城里町などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



御前山（内山）

コケミズ

Pilea peploides (Gaudich.) Hook. et Arn. var. *peploides*

イラクサ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東以西）・四国・九州・琉球／朝鮮・中国・マレーシア・インド・ハワイ・ガラパゴス諸島

生 育 地 山地の湿り気のある岩場に生える。太子町，常陸太田市，常陸大宮市，筑波山などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



太子町（内山）

ウナギツカミ

Persicaria aestiva Ohki (102)

タデ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮南部

生 育 地 放棄水田や水田脇の土手に生える。筑西市，桜川市，結城市などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



桜川市（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ヤナギヌカボ

Persicaria foliosa (H.Lindb.) Kitag. var. *paludicola* (Makino) H.Hara

タデ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 北海道・本州・九州／基本種はヨーロッパよりシベリアをへてアムール・ウスリー・中国(東北)まで

生 育 地 低地の日当たりのよい湿地に生える。攪乱を受ける湿地、休耕田、溜池畔などに生育する。常陸太田市に生育する。

選 定 理 由 河川の改修、湿地の開発

そ の 他

ナガバノウナギツカミ

Persicaria hastatosagittata (Makino) Nakai

タデ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州・四国・九州／中国(南部・台湾)

生 育 地 河川敷、溜池付近にある湿地などに生える。水戸市、鉾田市、神栖市、土浦市、稲敷市などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発、遷移の進行

そ の 他



稲敷市(内山)

ヌカボタデ

Persicaria taquetii (H.Lev.) Koidz.

タデ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 本州・四国・九州／朝鮮

生 育 地 河川敷などの草地や湿地に生える。県南、県西地域の河川流域などに生育する。

選 定 理 由 河川の改修、湿地の開発

そ の 他



八千代町(内山)

ニオイタデ

Persicaria viscosa (Buch.-Ham. ex D.Don) H. Gross ex T.Mori

タデ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州(関東以西)～九州／ウスリー・中国・朝鮮・インド

生 育 地 原野，低山の日当たりに生える。行方市，神栖市，稲敷市などに生育する。

選 定 理 由 遷移の進行，湿地の開発

そ の 他



(県博収蔵標本：龍ヶ崎市産)

ノダイオウ

Rumex longifolius DC.

タデ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 北海道・本州(中部以北および和歌山県など)／北半球

生 育 地 川岸などの湿った草地などに生える。吾国山などに生育する。

選 定 理 由 河川の改修，湿地の開発

そ の 他



(県博収蔵標本：常総市産)

ワダソウ

Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax

ナデシコ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・九州／朝鮮・中国・ウスリー

生 育 地 山野の落葉樹林下や小さな崖地などに生える。常陸大宮市，常総市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸大宮市(内山)

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ナンブワチガイソウ

Pseudostellaria japonica (Korsh.) Pax

ナデシコ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 本州／中国（北部・西南部・東北）・ウスリー

生 育 地 山地の明るい林下や林縁などに生える。北茨城市，高萩市，常陸太田市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



北茨城市（内山）

ヤマグルマ

Trochodendron aralioides Siebold et Zucc.

ヤマグルマ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（山形県南部以南）・四国・九州・琉球・伊豆諸島／台湾・朝鮮南端部

生 育 地 山地の急な斜面を好み岸壁のようなところに生える。男体山に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他 男体山では、ナガバナヤマグルマに相当すると思われるが、十分には区別できない。



男体山（内山）

ヒメイチゲ

Anemone debilis Fisch. ex Turcz.

キンポウゲ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州（近畿地方以北）／シベリア東部～中国（北部・東北）・朝鮮・千島

生 育 地 主に亜高山帯や高山帯などに生える。北茨城市，常陸太田市の冷温帯の溪谷林に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



北茨城市（内山）

レンゲショウマ

Anemonopsis macrophylla Siebold et Zucc.

キンポウゲ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（主として太平洋側）〔日本固有種〕

生 育 地 山地の落葉広葉樹林下などに生える。北茨城市、高萩市、常陸太田市、大子町、常陸大宮市などに生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない、森林の伐採

そ の 他



大子町（内山）

カザグルマ

Clematis patens C.Morren et Decne.

キンポウゲ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012 準絶滅危惧（NT）

分 布 本州・四国・九州（北部）／朝鮮・中国（東北の南部）

生 育 地 主に湿り気のある林縁に生える。大子町、那珂市、東海村、ひたちなか市、水戸市などに生育する。

選 定 理 由 園芸採取、森林の伐採

そ の 他



ひたちなか市（内山）

コキツネノボタン

Ranunculus chinensis Bunge

キンポウゲ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

分 布 北海道（南部）・本州・四国・九州／中国・朝鮮・シベリア東部

生 育 地 日当たりのよい湿地や河川敷などに生える。取手市、稲敷市などに生育する。

選 定 理 由 河川の改修、湿地の開発

そ の 他



（県博収蔵標本：常総市産）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

オトコゼリ

Ranunculus tachiroei Franch. et Sav.

キンポウゲ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州／朝鮮

生 育 地 川岸や水田などの湿り気の多いところに生える。城里町、笠間市、鹿嶋市などに生育する。最近の報告はない。

選 定 理 由 湿地の開発、遷移の進行

そ の 他



(中崎所蔵標本：笠間市産)

ヒキノカサ

Ranunculus ternatus Thunb.

キンポウゲ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 本州 (関東地方以西)・四国・九州／中国 (本土・台湾)・朝鮮 (済州島)

生 育 地 日当たりのよい湿った草地などに生える。河内町や小貝川などの河畔に生育する。

選 定 理 由 河川の改修

そ の 他



常総市 (内山)

ノカラムツ

Thalictrum simplex L. var. *brevipes* H.Hara

キンポウゲ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 本州 (東北地方南部以南)・四国・九州／朝鮮南部・中国 (中北部・東北)

生 育 地 日当たりのよい湿り気のある河川敷などの草地に生える。つくば市、取手市、常総市などに生育する。

選 定 理 由 河川の改修

そ の 他



常総市 (内山)

コウホネ

Nuphar japonica DC.

スイレン科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道（西南部）・本州・四国・九州／朝鮮

生 育 地 浅い池や沼または小さな流れに生える。大子町、那珂市、茨城町、牛久市などに生育する。

選 定 理 由 河川の改修

そ の 他



那珂市（内山）

オオバウマノズクサ

Aristolochia kaempferi Willd.

ウマノズクサ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（関東以西）・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 山地の日当たりのよい林縁や林下などに生える。常陸太田市、筑波山などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他 タンザワウマノズクサを含む。



桜川市（内山）

ヤマシャクヤク

Paeonia japonica (Makino) Miyabe et Takeda

ボタン科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012 準絶滅危惧（NT）

分 布 本州（関東・中部地方以西）・四国・九州／朝鮮 [日本固有種]

生 育 地 山地の湿り気のある落葉広葉樹林下などに生える。北茨城市、高萩市、大子町、つくば市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他 ケヤマシャクヤクを含む。



常陸太田市（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

モウセンゴケ

Drosera rotundifolia L.

モウセンゴケ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／北半球の温帯、
亜寒帯

生 育 地 日当たりのよい湿地や崖地の湿り気のあると
ころに生える。北茨城市，高萩市，日立市，
東海村などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



常陸太田市（内山）

ハクサンハタザオ

Arabidopsis halleri (L.) O'Kane et Al-Shehbaz subsp. *gemmifera* (Matsum.) O'Kane et Al-Shehbaz

アブラナ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国（剣山）・九州（宮崎県）
／朝鮮

生 育 地 山地の日当たりよい草地や林縁などに生え
る。大子町，常陸太田市，常陸大宮市などに
生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町（中崎）

ハマハタザオ

Arabis stelleri DC. var. *japonica* (A.Gray) F.Schmidt

アブラナ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮南部・中国（中
北部・東北）・樺太・千島

生 育 地 海岸の砂地から草地などに生える。北茨城市
から神栖市の海岸に点々と生育する。

選 定 理 由 海岸の開発

そ の 他



高萩市（内山）

コイヌガラシ

Rorippa cantoniensis (Lour.) Ohwi

アブラナ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州（関東以西）・四国・九州／朝鮮・中国・アムール・ウスリー

生 育 地 河原，休耕田，留池に隣接する湿地などに生える。つくばみらい市，稲敷市，筑西市，常総市，坂東市，八千代町などに生育する。

選 定 理 由 河川の改修

そ の 他



常総市（内山）

ハタザオ

Turritis glabra L.

アブラナ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／ユーラシアに広く分布し，北アメリカやオーストラリアにも帰化している

生 育 地 山野の明るい草地や海岸の草地などに生える。稲敷市などの県南地域や，ひたちなか市などに生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



ひたちなか市（内山）

ウメバチソウ

Parnassia palustris L. var. *palustris*

ユキノシタ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／台湾・東アジア北部・樺太・千島

生 育 地 山地の日当たりのよい湿地に生える。県北山地，笠間市，加波山，筑波山などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



北茨城市（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

エドヒガン

Cerasus spachiana Lavalee ex H.Otto var. *spachiana* f. *ascendens* (Makino) H.Ohba

バラ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／朝鮮（済州島）・中国（台湾・大陸中部）

生 育 地 山地に生える。高萩市、大子町、常陸大宮市、城里町、笠間市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



御前山（内山）

オオダイコンソウ

Geum aleppicum Jacq.

バラ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州（中北部）／ヨーロッパからシベリア・中国・朝鮮・樺太

生 育 地 山地の林縁や道ばたなどに生える。常陸太田市に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採，草地の開発，遷移の進行

そ の 他



（県博収蔵標本：高萩市産）

リンボク

Laurocerasus spinulosa (Siebold et Zucc.) C.K.Schneid.

バラ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（茨城県・福井県以西）・四国・九州・琉球（沖縄島）／台湾・フィリッピン

生 育 地 山地のやや湿り気のある林下に生える。北茨城市，高萩市，常陸太田市，城里町，桜川市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸大宮市（藤田）

モリイバラ

Rosa onoei Makino var. *hakonensis* (Franch. et Sav.) H. Ohba

バラ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（関東以西）・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 山地のやや湿り気のある林下や登山道脇などに生える。筑波山，笠間市，城里町，常陸大宮市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



城里町（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ハマナス

Rosa rugosa Thunb.

バラ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 北海道・本州（太平洋側では茨城県南部まで・日本海側では島根県まで）／東アジアの温帯から亜寒帯

生 育 地 海岸砂地に生え，地下茎を伸ばし大群落をつくる。鹿嶋市に生育する。

選 定 理 由 海岸の開発

そ の 他 鹿嶋市大小志碕に国指定のハマナス自生南限地がある。



鹿嶋市（内山）

ナガボノシロワレモコウ

Sanguisorba tenuifolia Fisch. ex Link var. *alba* Trautv. et Mey. (102)

バラ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道・本州（東北・関東地方）／樺太

生 育 地 山野の湖畔や湿り気のある草地に生える。土浦市，つくば市，竜ヶ崎市，河内町などに生育する。

選 定 理 由 河川の改修，湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



稲敷市（内山）