

# 平成 24 年 細菌性赤痢発生状況

平成 24 年 12 月 4 日現在

NO	性別	年齢	所在地	発症日	診断日	菌類
1	男性	20 歳代	つくば保健所管内	2 月 16 日	2 月 23 日	ソクネ菌 (D 群)
2	男性	20 歳代	竜ヶ崎保健所管内	3 月 25 日	3 月 30 日	フレキシネル菌 (B 群)
3	女性	50 歳代	潮来保健所管内	4 月 24 日	5 月 9 日	フレキシネル菌 (B 群)
4	女性	20 歳代	土浦保健所管内	10 月 7 日	10 月 12 日	ソクネ菌 (D 群)
5	女性	60 歳代	つくば保健所管内	11 月 13 日	11 月 20 日	フレキシネル菌 (B 群)

## <細菌性赤痢の年次発生届出状況>

年	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
本県	6	8	5	7	4	5	5	5

※平成 24 年の届出数は、今回の発生数を含む。

※平成 24 年の全国の細菌性赤痢の発生届出数 (10 月 7 日現在) は、171 人です。

## <細菌性赤痢の特徴>

- ・ 潜伏期間 1~5 日間 (通常 3 日以内)
- ・ 主な症状 血便、下痢、腹痛、しぶり腹、発熱 (1~2 日)
- ・ 感染経路 経口感染 (水や食べ物を通じて「口」から感染する。)
- ・ 接触感染

## <渡航先での予防策>

- ・ 生水・氷入りジュース・水割り等の飲料に注意する。
- ・ 生野菜、生の魚介類、カットフルーツ、アイスクリーム等の飲食に注意する。
- ・ 調理後時間の経った食物は食べない。
- ・ 手洗いの励行や体調管理に気をつける。

感染症流行情報については、茨城県保健予防課のホームページ

<http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/yobo/yobo.htm> をご覧ください。