

昭和57年度  
内水試  
から版 3号 50  
昭和58年  
2月22日

## 納生實養鯉に

### 改善飼料を

すでに御存知と思いますが、本年す。

四月から納生實で養成するコイの投与飼料の成分が変ることになりました。これは、霞ヶ浦北浦の湖水の汚水を少しでも防止しようと、汚水を少しだけ減らす目的によるものです。

昨年、当場と水産大学が共同でコイ

の新飼料試験を行い、その結果に

基づいて、茨城県がコイ育成用飼料の成分基準（暫定基準）を示し、ヨリ、湖水へのチッ素負荷量

これを受けて飼料メーカーは、この基準を満した飼料を本年四月から製造販売するためです。

茨城県がメーカーに示した飼料成分の暫定基準は次のとおりです。

実際に養鯉をやめている

湖内産フカサギ採卵  
の結果について  
本年1月31日～2月19日  
の間 計6回、霞ヶ浦漁連主催  
で湖内産フカサギによる人工

採卵が実施されました。

この結果で採卵率が底魚に26%の卵が残っており、この点についてはよくあります。(ね)に採卵するこ等改善の余地



- 一、粗蛋白質 % 以下。
- 二、総カロリー kcal/kg 以上又は下消せ  
カロリ 350 以上を目標とする。

また、この基準を満していふ  
飼料（改善飼料）には左のよ  
うな表示が飼料袋等にされま  
す。

皆様には、諸々の不安をお持ち  
と思いますが、一方、霞ヶ浦  
北浦の湖水の汚水を切实に肌  
で感じられ、キレイな湖水にした  
い、と一貫に鬼ぬれでいるのも  
皆様と存じますので、一致団結  
してこの改善飼料を使用するこ  
とによって、霞ヶ浦北浦の淨化  
を身を持ってしていこうことは  
ありませんか!!

なぞ、改善飼料を使用した結果  
何か御忠付の事がありました  
ら、内水試まで御連絡下さい。

全採卵使用雌(尾)魚体重 (平均 g/尾)	24,766 g / 1,914 尾 (12.9 g)
採卵前の雌 魚体重 (平均 g/尾)	31,849 g / 1,914 尾 (16.6 g)
全・雄 魚体重 (平均 g/尾)	89,443.8 g / 9,173 尾 (9.8 g)
全・未熟・不明 魚体重 (平均 g/尾)	19,672 g / 1,642 尾 (12.0 g)
全・合計 魚体重 (平均 g/尾)	133,881 g / 12,729 尾 (10.5 g)
全・着卵シロ枚数	1,600 枚

