

情報不足①注目種

アカハナワラビ

Botrychium nipponicum Makino

ハナヤスリ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（宮城県以南）・四国・九州／朝鮮・中国

生 育 地 日当たりのよい林下に生える。オオハナワラビと混同されていたため、今後の調査が必要である。

選 定 理 由

そ の 他



笠間市（内山）

ウスイハナワラビ

Botrychium nipponicum Makino var. *minus* (H.Hara) K.Iwats.

ハナヤスリ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州中部 【日本固有種】

生 育 地 日当たりのよい林下に生える。2009年、岡利雄氏により土浦市で県内では初めての生育が確認された。今後の調査によりさらに生育地が増えることが期待される。

選 定 理 由

そ の 他 土浦市の生育地では、放射能の除染作業により、土壌が削り取られており、今後生育が確認できるかどうか、現在は不明である。



（県博収蔵標本：土浦市産）

ヤマソテツ

Plagiogyria matsumureana Makino

キジノオシダ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（東北地方南部以南）・四国・九州（奄美大島まで）／済州島・中国・台湾

生 育 地 山地林下に生える。笠間市（75）の記録があるが、現地の再確認はされていない。最近大子町でスギ林下に1株の生育が確認された。

選 定 理 由

そ の 他



大子町（中崎）

フモトカグマ

Microlepia pseudostrigosa Makino

コバノイシカグマ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東地方南部・静岡県・愛知県）

生 育 地 山地林下に生える。日立市のスギ林下に生育が確認されている。さらに今後の調査が必要である。

選 定 理 由

そ の 他



日立市（中崎）

絶
滅

絶
滅
危
惧
Ⅰ
A
類

絶
滅
危
惧
Ⅰ
B
類

絶
滅
危
惧
Ⅱ
類

準
絶
滅
危
惧

情
報
不
足
①
注
目
種

情
報
不
足
②
現
状
不
明
種

フジシダ

Monachosorum maximowiczii (Baker) Hayata

コバノイシカグマ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（福島県・関東地方以西）・四国・九州（南部を除く）／中国・台湾

生 育 地 地上や岩上に群生する。大子町のスギ林下で生育が確認されている。

選 定 理 由

そ の 他 最近、間伐が行われ、林下の状況が大きく変化したため、今後の生育状況に影響があるかも知れないため、継続観察が必要と思われる。



大子町（中崎）

ミヤコヤブソテツ

Cyrtomium fortunei J.Sm. var. *intermedium* Tagawa

オシダ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東地方以西）・四国・九州／中国

生 育 地 山地林下に生える。常陸太田市、石岡市に生育するが、さらに今後の調査が必要である。

選 定 理 由

そ の 他



常陸太田市（安嶋）

ハチジョウベニシダ

Dryopteris caudipinna Nakai

オシダ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012

分 布 神奈川県南部・伊豆半島・伊豆諸島

生 育 地 山地林下に生える。最近の調査で各地のスギ林下に生育が確認されてきている。さらに今後の調査が必要である。

選 定 理 由

そ の 他



笠間市（藤田）

ギフベニシダ

Dryopteris kinkiensis Koidz. ex Tagawa

オシダ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（宮城県および千葉県以西）・四国・九州／朝鮮・中国

生 育 地 山麓の林縁などに生える。行方市（29）、潮来市（29）に記録がある。さらに今後の調査が必要である。

選 定 理 由

そ の 他

絶
滅

絶
滅
危
惧
Ⅰ
A
類

絶
滅
危
惧
Ⅰ
B
類

絶
滅
危
惧
Ⅱ
類

準
絶
滅
危
惧

情
報
不
足
①
注
目
種

情
報
不
足
②
現
状
不
明
種

キノクニベニシダ

Dryopteris kinokuniensis Sa.Kurata

オシダ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 山地林下に生える。県内では、最近、生育が知られてきたもので、今後の調査が必要である。

選 定 理 由

そ の 他



(県博収蔵標本：つくば市産)

エンシュウベニシダ

Dryopteris medioxima Koidz.

オシダ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州

生 育 地 山地林下に生える。県内では、最近、生育が知られてきたもので、今後の調査が必要である。

選 定 理 由

そ の 他



行方市 (安)

ハスノハカズラ

Stephania japonica (Thunb.) Miers

ツツラフジ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州西部・四国・九州・琉球／中国（中南部・台湾）・インド・マレーシア

生 育 地 山地に生える。高萩市、笠間市に生育するが、さらに今後の調査が必要である。

選 定 理 由

そ の 他

ワタラセツリフネソウ

Impatiens ohwadae M.Watanabe & Seriz. (135)

ツリフネソウ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（群馬県・栃木県・埼玉県・茨城県・千葉県）

生 育 地 河川敷や休耕田など湿地に生える。取手市、常総市、古河市などに生育する。

選 定 理 由

そ の 他 2009年に新種として記載された(135)。ツリフネソウに比べて側花弁が短く先端が萎縮してシミが付いたように見える



常総市 (小幡)

オオアカバナ

Epilobium hirsutum L.

アカバナ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 本州（青森県・秋田県・福島県・佐渡・長野県・石川県）／ユーラシア大陸

生 育 地 川岸の湿地や谷間の湿地に生える。鹿行地域の休耕田で確認された。さらに今後の調査が必要である。

選 定 理 由

そ の 他



銚田市（中崎）

ホソバアカバナ

Epilobium palustre L.

アカバナ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州中部以北／ユーラシア・北アメリカの温帯

生 育 地 湿地に生える。北茨城市（133）で生育の記録があるが、最近では確認されていない。

選 定 理 由

そ の 他



（県博収蔵標本：北茨城市産）

ミヤマヤブニンジン

Osmorhiza aristata (Thunb.) Rydb. var. *montana* Makino

セリ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州／朝鮮

生 育 地 山地林下に生える。大子町での生育が確認されているが、今後さらに調査が必要である。

選 定 理 由

そ の 他



（中崎所蔵標本：大子町産）

ヒメシロアサザ

Nymphoides coreana (H.Lev.) H.Hara

ミツガシワ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 本州・四国・九州・琉球（石垣島・西表島）／朝鮮・中国

生 育 地 池や沼に生える。境町の休耕田に生育する。

選 定 理 由

そ の 他



境町（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

コナミキ

Scutellaria guilielmii A.Gray

シソ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 本州(千葉県以西)・四国・九州・琉球

生 育 地 日当たりのよい草地に生える。日立市の標本により確認されたものであり、生育地の状況は不明である。今後の調査が必要である。

選 定 理 由

そ の 他 最近、茨城県や栃木県で生育が確認されたものであり、今後さらに調査が必要である。



(中崎所蔵標本：日立市産)

ヒシモドキ

Trapella sinensis Oliv.

ゴマ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧ⅠB類 (EN)

分 布 本州・九州／朝鮮・中国

生 育 地 池や沼に生える。石岡市で埋土種子からの発芽と思われる生育が確認されている(140)。

選 定 理 由

そ の 他



石岡市産栽培(安)

キヨスミウツボ

Phacellanthus tubiflorus Siebold et Zucc.

ハマウツボ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・ウスリー・樺太・中国(中北部・東北)

生 育 地 山地林下に生える。県内での記録は北茨城市(115)や男体山(115)などにあるが、再確認はされていない。

選 定 理 由

そ の 他



(県博収蔵標本：北茨城市産)

ソナレマツムシソウ

Scabiosa japonica Miq. f. *littoralis* Nakai

キク科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 本州(関東地方) [日本固有種]

生 育 地 海岸の草地に生える。ひたちなか市に生育する。今後の調査が必要である。

選 定 理 由

そ の 他



ひたちなか市(内山)

ツツイトモ

Potamogeton pusillus L.

ヒルムシロ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 北海道, 本州, 四国, 九州ノヨーロッパ, 北アメリカ

生 育 地 池沼や河川, 水路に生える。鹿嶋市や茨城町で確認されている。

選 定 理 由

そ の 他



(県博収蔵標本：北浦産)

ネジリカワツルモ

Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande

ヒルムシロ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 北海道, 本州, 四国, 九州ノアジア, ヨーロッパ, アメリカ, アフリカ

生 育 地 低地の水中に生える。茨城町に古い記録があるが、現在は確認できていない。

選 定 理 由

そ の 他



(県博収蔵標本：溜沼産)

ヒロハノアマナ

Amana latifolia (Makino) Honda

ユリ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 本州 (関東地方～近畿地方)・四国 [日本固有種]

生 育 地 山地の林の中や明るい草地に生える。北茨城市に生育する。

選 定 理 由

そ の 他



(県博収蔵標本：北茨城市産)

ベンケイヤワラスゲ

Carex benkei Tak. Shimizu (105)

カヤツリグサ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州 (関東地方：茨城県・近畿地方・中国地方)・四国・九州

生 育 地 湿地に生える。常陸太田市の溜池周辺や休耕田などに生育する。

選 定 理 由

そ の 他 最近 (2009), 新種として発表されたものであり (105), 今後の調査が必要である。



常陸太田市 (内山)

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

クロヒナスゲ

Carex gifuensis Franch.

カヤツリグサ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（栃木県日光付近・岐阜県・三重県）〔日本固有種〕

生 育 地 林下に生える。常陸大宮市、石岡市で生育が確認されているが、生育範囲はあまり広くない。さらに今後の調査が必要である。

選 定 理 由

そ の 他



常陸大宮市（内山）

チャボイ

Eleocharis parvula (Roem. et Schult.) Link ex Bluff, Nees et Schauer

カヤツリグサ科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

分 布 本州（青森県・宮城県・岡山県）・四国・九州／ヨーロッパ・シベリア・北アフリカ・南北アメリカ

生 育 地 海水の出入りする塩田に生える。鹿嶋市や茨城町に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他 博物館標本の検討により茨城にも生育することがわかった。



（県博収蔵標本：茨城町産）

サガミランモドキ

Cymbidium aberrans (Finet) Schltr.

ラン科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧ⅠB類（EN）

分 布 本州（関東地方）〔日本固有種〕

生 育 地 スダジイ林下に生える。守谷市に生育する。

選 定 理 由

そ の 他



守谷市（小幡）

タシロラン

Epipogium roseum (D. Don) Lindl.

ラン科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012 準絶滅危惧（NT）

分 布 本州（関東南部）・九州・琉球

生 育 地 常緑樹林下に生える。石岡市、坂東市に生育するが、今後さらに調査が必要である。

選 定 理 由

そ の 他



坂東市（宮本）

クロヤツシロラン

Gastrodia pubilabiata Sawa

ラン科

茨城県2012 情報不足①注目種

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州

生 育 地 竹林などの林下に生える。最近石岡市や鹿行地域で生育が確認されている。さらに今後の調査が必要である。

選 定 理 由

そ の 他 1971に高萩市のアキザキヤツシロランとして採集されたものは本種であった。



石岡市 (小松崎)

絶
滅

絶
滅
危
惧
I
A
類

絶
滅
危
惧
I
B
類

絶
滅
危
惧
II
類

準
絶
滅
危
惧

情
報
不
足
①
注
目
種

情
報
不
足
②
現
状
不
明
種